

皮肤病靶向治疗专家共识(2025 版)

中国医学装备协会皮肤病与皮肤美容分会

通信作者:张学军, Email: ayzxj@vip.sina.com

【摘要】 随着近年皮肤病学研究的发展,一些新型生物制剂及小分子靶向药物逐渐用于皮肤病治疗,显示出较好的疗效,尤其是在复杂及难治性皮肤病的治疗方面发挥了积极作用。如何将靶向治疗合理、有效、安全地用于皮肤病的治疗已经成为临床工作中备受关注的课题。为此,中国医学装备协会皮肤病与皮肤美容分会组织相关专家依据国内外研究数据和临床指南共识,结合中国皮肤病患者的特点,通过多次深入讨论和修改制订本共识,按照疾病分类,从生物制剂及小分子靶向药物的临床应用原则、治疗方案等方面为临床医生提供具体的指导意见。

【关键词】 皮肤疾病; 治疗; 靶向药物; 生物制品; 化学制品; 专家共识

DOI: 10.35541/cjd.20240054

Expert consensus on the treatment of dermatoses with targeted drugs (2025 version)

Committee on Skin Disease and Cosmetic Dermatology, China Association of Medical Equipment

Corresponding author: Zhang Xuejun, Email: ayzxj@vip.sina.com

【Abstract】 With the progress in dermatology in recent decades, some new biologic agents and small-molecule targeted drugs have been approved for the treatment of skin diseases, and have showed favorable therapeutic effect, especially in the treatment of complex and refractory dermatoses. However, how to apply targeted therapy reasonably, effectively and safely in the treatment of skin diseases has become a matter of great concern in clinical practice. To this end, the Committee on Skin Disease and Cosmetic Dermatology, China Association of Medical Equipment organized relevant experts to formulate this consensus through multiple in-depth discussions and revisions based on Chinese and international research data, clinical guidelines and consensus, as well as characteristics of Chinese patients. According to the classification of diseases, specific guidance was provided in this consensus for clinicians regarding the clinical application principles and treatment protocols of biologic agents and small-molecule targeted drugs.

【Key words】 Skin diseases; Therapy; Targeted drugs; Biologic products; Chemical agents; Expert consensus

DOI: 10.35541/cjd.20240054

靶向治疗是利用生物制剂及小分子靶向药物对疾病特有的发病机制、通路进行抑制或阻断从而达到治疗效果。相对于传统药物特异性差、治疗疗效差异大、不良反应多等特点,靶向治疗药物可靶向疾病特有的细胞因子、核酸片段等,选择特异性强,毒性相对小,治疗效果精准明显,不良反应少^[1]。靶向药物包含化学制剂(小分子化合物)和生物制剂(小分子多肽与大分子抗体)两大类。为了更好地指导皮肤科医生规范使用生物制剂及小分子靶向药,促进中国皮肤科医生在皮肤病靶向治疗方面与国际接轨,中国医学装备协会皮肤病与皮肤美容分会组织相关专家,依据各种生物制剂临床或真实世界研究的数据、近年国内外发表的生物治疗指南或专家共识以及编写的专家临床经验,历经多次讨论修改,制订皮肤病靶向治疗中国专家共

识,本共识按照疾病分类进行分别阐述。

本共识主要供皮肤科及相关学科的医生、科研工作者使用。随着生命科学理论与技术的快速发展,新靶点的发现及不同类型的靶向药物在不断涌现。在共识编写的过程中,编写组成员最大程度考虑了该共识完成时与当前知识水平相适应的信息。同时,编写组严格控制甄别取舍相关知识的标准,但靶向药物应用于临床时间较短,本共识推荐的部分药物证据等级低,难免存在不足之处,敬请读者不吝指正,并鼓励读者不断获取该领域的新进展。文中涉及的相关靶向药物治疗过程中的监测及随访等信息请参考药品使用说明书。本共识依据国内外食品药品监督管理局获批适应证情况、已发表的指南/共识、临床或真实世界研究数据及编写的专家临床经验制定推荐强度分级:推荐等级 A,具

有高质量证据支持,推荐程度强;推荐等级 B,具有良好证据支持,推荐程度中等;推荐等级 C,具有较弱证据支持,推荐程度弱。

一、红斑鳞屑性皮肤病

(一)银屑病(psoriasis)

银屑病是一类免疫介导的慢性、复发性、炎症性、系统性皮肤病,其分型包括寻常型、关节病型、脓疱型和红皮病型 4 型,寻常型中斑块状银屑病最为常见。银屑病的治疗方案需要根据疾病分型、分期(进展期、稳定期和消退期)和分级(轻、中、重度)进行选择。治疗主要包括外用药物、光疗、系统药物、中医药等。轻中度患者推荐局部外用药物及光疗,中重度患者推荐使用的传统药物包括甲氨蝶呤(methotrexate, MTX)、维 A 酸类、环孢素(cyclosporin A, CSA)等。治疗原则为规范、安全、个体化^[2]。

目前研究已明确显示 IL-23/Th-17 轴在银屑病的发生发展中起主导作用^[3-4]。多种生物制剂在治疗中重度、难治性及特殊类型银屑病方面发挥积极而有效的作用,逐渐成为治疗银屑病的主要系统用药。此外,多种小分子靶向药物如磷酸二酯酶 4

(phosphodiesterase 4, PDE-4)、Janus 激酶(JAK)抑制剂也逐渐应用于银屑病的治疗^[5]。表 1 汇总了国内外获批用于银屑病治疗的靶向药物。

(二)毛发红糠疹(pityriasis rubra pilaris, PRP)

PRP 是一种少见的慢性炎症性丘疹鳞屑性皮肤病,病因和发病机制不明,目前普遍认为其发病与遗传、维生素 A 代谢紊乱、感染等有关^[7]。常规治疗包括系统应用维 A 酸类药物、MTX、CSA,外用糖皮质激素(简称激素),以及物理治疗等,但效果并不理想,且起效缓慢。

生物制剂如 TNF- α 抑制剂英夫利西单抗(IFX)、依那西普、阿达木单抗(ADA)和 IL-12/23 抑制剂如乌司奴单抗等治疗 PRP 疗效较好,多数难治性 PRP 可以获得缓解^[8],传统治疗难以取得满意疗效时可考虑使用,用法用量可参考银屑病章节。生物制剂可单独或与传统治疗方法联合治疗 PRP,联合治疗主要包括口服阿维 A、MTX 和局部或系统应用激素。

(三)扁平苔藓(lichen planus, LP)

LP 是一种发生于皮肤、毛囊、黏膜和指(趾)甲的常见的病因不明的慢性炎症性疾病,有 3 种主要亚型:皮肤型、黏膜型和附属器型。皮肤 LP 通常呈自限性,超过 50% 的患者在 6 个月内痊愈,高达

表 1 治疗斑块状银屑病的生物制剂和小分子靶向药物相关信息

药物名称	靶向分子	国外获批情况 (截至 2024 年 9 月)	国内获批情况 (截至 2024 年 9 月)	推荐 等级 ^a	剂量及使用方法
依那西普 (etanercept)	TNF- α	2004 年 FDA 批准,现批准适于系统疗法或光疗的慢性中重度斑块状银屑病患者	2006 年 NMPA 批准依那西普的生物类似物用于成年人中重度斑块状银屑病的治疗	A	成人:推荐皮下注射 25 mg 每周 2 次,或 50 mg 每周 1~2 次
英夫利西单抗 (infliximab)	TNF- α	2006 年 FDA 批准,现批准用于银屑病关节炎和适于系统治疗的成人重度斑块状银屑病	2007 年 NMPA 批准,现批准用于需系统治疗且对 CSA、MTX 或光化学疗法等系统治疗无效、禁忌或不能耐受的慢性重度斑块状银屑病成年患者	B	成人:第 0、2、6 周以及此后每 8 周予静脉滴注 5 mg/kg,输注过程需缓慢完成,至少需 2 h,并密切监测无严重不良反应发生。第 14 周后没有应答,则不应继续治疗
阿达木单抗 (adalimumab)	TNF- α	2008 年 FDA 批准,现批准用于银屑病关节炎和适合系统治疗或光疗的中度至重度斑块状银屑病成人患者	2016 年 NMPA 批准,现批准用于需要进行系统治疗的成年中重度慢性斑块状银屑病患者	A	成人:第 0 周皮下注射 80 mg,首次给药 1 周后,每 2 周皮下注射 40 mg
培塞利珠单抗 (certolizumab pegol)	TNF- α	2018 年 FDA 批准,现批准用于系统治疗的成年中重度慢性斑块状银屑病患者	暂未获批	B	成人:第 0、2、4 周皮下注射 400 mg,维持剂量为皮下注射 200 mg,每 2 周 1 次或 400 mg,每 4 周 1 次(参考 FDA 说明)
司库奇尤单抗 (secukinumab)	IL-17A	2015 年 FDA 批准,现批准用于 6 岁以上适合光疗或系统治疗的斑块状银屑病、银屑病关节炎患者	2019 年 NMPA 批准,现批准用于符合系统治疗或光疗指征的 6 岁及以上中度至重度斑块状银屑病患者	A	成人:第 0、1、2、3、4 周单次皮下注射 300 mg,随后每 4 周 1 次 300 mg(体重低于 60 kg 可以考虑给药剂量 150 mg)。6 岁及以上儿童:体重 < 50 kg,推荐单次剂量为 75 mg;体重 $\geq$ 50 kg,推荐单次剂量为 150 mg
依奇珠单抗 (ixekizumab)	IL-17A	2016 年 FDA 批准,现批准用于 6 岁以上适合系统治疗或光疗的中度至重度斑块状银屑病或银屑病关节炎患者	2019 年 NMPA 批准,现批准用于治疗适合系统治疗或光疗的中度至重度斑块状银屑病患者	A	成人:第 0 周皮下注射 160 mg,第 2、4、6、8、10、12 周分别皮下注射 80 mg,此后单次剂量为 80 mg,每 4 周 1 次

续表 1

药物名称	靶向分子	国外获批情况 (截至 2024 年 9 月)	国内获批情况 (截至 2024 年 9 月)	推荐 等级 ^a	剂量及使用方法
布罗利尤单抗 (brodalumab)	IL-17A	2017 年 FDA 批准, 现批准用于 治疗适合系统治疗或光疗的 中度至重度斑块状银屑病或 其他系统治疗无效的成人患 者	2020 年 NMPA 批准, 现批准 用于适合系统治疗或光疗的 成人中至重度斑块状银屑病 患者	B	成人: 第 0、1、2 周分别皮下注射 210 mg, 此后每 2 周皮下注射 210 mg
乌司奴单抗 (ustekinumab)	IL-12/23	2009 年 FDA 批准, 现批准用于 6 岁以上银屑病关节炎和 中度至重度斑块状银屑病患 者	2017 年 NMPA 批准, 现批准 用于对 CSA、MTX 等其他系 统治疗或 PUVA(补骨脂素和 紫外线 A)不应答、有禁忌或 无法耐受的 6 岁以上中重度 斑块状银屑病患者	A	成人: 第 0、4 周及此后每 12 周 皮下注射 45 mg。对体重 > 100 kg 的患者, 建议每次剂量为 90 mg。 6 岁以上儿童: 体重 < 60 kg, 每 次 0.75 mg/kg; 体重 60 ~ 100 kg, 45 mg/次; 体重 > 100 kg, 90 mg/次。 第 0、4 周皮下注射, 此后每 12 周 用药 1 次
古塞奇尤单抗 (guselkumab)	IL-23 p19	2017 年 FDA 批准, 现批准用于 适合系统治疗的中重度斑 块状银屑病和银屑病关节炎 成人患者	2019 年 NMPA 批准, 现批准 用于适合系统性治疗的中重 度斑块状银屑病成人患者	A	成人: 第 0 周和第 4 周皮下注射 100 mg, 此后每 8 周皮下注射 100 mg
利生奇珠单抗 (risankizumab)	IL-23 p19	2019 年 FDA 批准, 现批准用于 适合系统治疗的中重度斑 块状银屑病和银屑病关节炎 成人患者	暂未获批	B	成人: 第 0 周、第 4 周皮下注射 150 mg, 此后每 12 周皮下注射 150 mg
替瑞奇珠单抗 (tildrakizumab)	IL-23 p19	2018 年 FDA 批准用于适合系 统治疗或光疗的中度至重 斑块状银屑病成人患者	2021 年 NMPA 批准, 适用于 适合系统治疗或光疗的成人 中度至重度斑块状银屑病患 者	B	成人: 第 0 周、第 4 周皮下注射 100 mg, 此后每 12 周皮下注射 100 mg
阿普米司特 (apremilast)	PDE-4	2014 年 FDA 批准, 现批准用于 符合光疗或系统治疗的成 人中重度斑块状银屑病患者	2021 年 NMPA 批准用于符合 光疗或系统治疗的成人中重 度斑块状银屑病患者	B	成人: 第 1 天口服 10 mg, 1 次; 第 2 天口服 10 mg, 2 次; 第 3 天 上午 10 mg、下午 20 mg; 第 4 天 20 mg, 2 次; 第 5 天上午 20 mg, 下午 30 mg; 此后 30 mg, 每日 2 次
托法替布 (tofacitinib)	JAK1、JAK3	2017 年 FDA 批准用于治疗活 动性银屑病关节炎	2022 年 NMPA 批准用于治疗 活动性银屑病关节炎	B	成人: 口服 5 mg, 每日 2 次(根据 FDA 对银屑病关节炎患者的推 荐剂量)
乌帕替尼 (upadacitinib)	JAK1	2021 年 FDA 批准用于治疗成 人活动性银屑病关节炎	2022 年 NMPA 批准用于治疗 对一种或多种 DMARD 疗效 不佳或不耐受的成人活动性 银屑病关节炎患者	B	成人: 银屑病关节炎推荐剂量 为口服 15 mg, 每日 1 次
氘可来昔替尼 (deucravacitinib)	TYK2	2021 年 FDA 批准, 现批准用于 适合系统治疗或光疗的成 人中重度斑块状银屑病患者	2023 年 NMPA 批准用于适合 系统治疗或光疗的成人中重 度斑块状银屑病患者	B	成人: 推荐剂量为口服 6 mg, 每 日 1 次
本维莫德乳膏 (benvitimod cream)	AhR	2022 年 FDA 批准用于成人银 屑病患者	2019 年 NMPA 批准, 现批准 用于适合局部治疗的成人轻 至中度稳定性寻常型银屑病 患者	A	成人: 皮肤局部外用, 均匀涂抹 患处, 形成一薄层即可, 每日 1 次或每日早晚各 1 次

注: TNF, 肿瘤坏死因子; IL, 白细胞介素; PDE, 磷酸二酯酶; JAK, Janus 激酶; TYK, 酪氨酸激酶; AhR, 芳香烃受体; FDA, 美国食品药品监督管理局; NMPA, 国家药品监督管理局; CSA, 环孢素; MTX, 甲氨蝶呤; DMARD, 改善病情抗风湿药; ^a参考中国银屑病生物制剂及小分子药物治疗指南(2024 版)^[6]、国内外临床研究数据及专家经验确定推荐等级

85% 的患者在 18 个月内痊愈^[9]。相比之下, 黏膜型 LP 通常是慢性的, 可能治疗无效^[10]。目前的一线治疗是局部和/或系统应用激素。此外, 免疫抑制剂常用于激素治疗不敏感或禁忌者。

JAK/STAT 通路是多种炎症细胞因子信号转导的重要通路^[11], 其在 LP 皮损中显著上调, 托法替布通过抑制 JAK1/3-STAT 通路, 从而抑制 γ 干扰素介导的信号转导和 CD8⁺ 细胞毒性 T 淋巴细胞募集达到治疗效果^[12-13]。目前, 对于托法替布在 LP 中应用

的认识多来自病例报告及病例系列研究, 在累及皮肤、黏膜、头皮、指甲的 LP 病例中应用托法替布可使病情都得到显著改善^[14-17], 传统治疗无法取得满意疗效时可考虑使用, 使用方法: 成人患者 5 mg 每天 2 次口服。

IL-17/IL-23 轴在许多慢性炎症性疾病的发病机制中起关键作用, 一些研究表明 LP 患者血清、皮肤或黏膜中 IL-17/IL-23 水平升高以及外周血和皮损中 Th17 细胞数量增加, 其可能与 LP 的发病机制

有关^[18-23]。因此,抑制 IL-17/IL-23 可能会对 LP 有积极的治疗效果。目前,对于抗 IL-17/IL-23 药物在 LP 中的应用多来自病例报告^[24-25]。

除此之外,PDE-4 抑制剂^[26]、CD20 抑制剂^[27]和 TNF- α 抑制剂^[28]等对 LP 也有一定的治疗效果。

二、变态反应性皮肤病

(一) 药物性皮炎 (drug eruption)

药物性皮炎指药物经注射、内服、吸入等途径进入人体后引起的皮肤、黏膜及其附属器的炎症反应^[29-30]。临床表现多样,根据严重程度可分为普通型(如固定性药疹、发疹型药疹、荨麻疹型药疹、多形红斑型药疹等)及重症型[如 Stevens-Johnson 综合征/中毒性表皮坏死松解症(SJS/TEN)、药物超敏反应综合征、急性泛发性发疹性脓疱病等]^[31]。其首要治疗措施是停用可疑致敏药物,其后需根据病情轻重选择治疗方式。轻症患者可考虑使用抗组胺药、维生素 C 及钙剂等。重症患者则须考虑使用激素、免疫抑制剂、静脉注射免疫球蛋白(IVIG)、血浆置换等治疗,同时可根据合并症加用抗感染治疗及支持治疗^[29-30,32]。

临床研究中已发现多种靶向药物(如 TNF- α 抑制剂、JAK 抑制剂、抗 IL-17 单抗、抗 IgE 单抗)可用于治疗不同类型的重症药疹,但多数为个案报道。目前,仅 TNF- α 抑制剂被国内专家共识推荐治疗 SJS/TEN^[32]。

综合相关文献,我们认为 TNF- α 抑制剂中的 IFX 和依那西普可应用于 SJS/TEN 患者,尤其是有合并症不能耐受大剂量激素治疗或者常规治疗效果不佳的 SJS/TEN 患者。推荐的使用方法为:① IFX 单剂 5 mg/kg,静脉滴注(推荐等级:B);② 依那西普 25 mg 或 50 mg(体重 > 65 kg)每周 2 次,皮下注射,连续使用至皮疹好转、原有治疗如激素减量后,可考虑停用(推荐等级:B)。

(二) 特应性皮炎 (atopic dermatitis, AD)

AD 是一种常见的慢性炎症性皮肤病,其临床特征是剧烈瘙痒和反复出现湿疹性皮损。AD 的治疗采用综合治疗策略和阶梯治疗的方式,即根据疾病的严重程度选择适宜的抗炎疗法。中重度 AD 患者经过局部治疗控制不佳,或皮损反复发作,严重影响生活质量,往往需要启用系统治疗。传统的系统治疗药物主要为免疫抑制剂[包括 CSA、MTX、硫唑嘌呤 (azathioprine, AZA)、吗替麦考酚酯

(mycophenolate mofetil, MMF)等]和系统用激素等,但绝大多数都属于超适应证用药,且免疫抑制剂的终末器官毒性和潜在的恶性肿瘤风险限制这类药物在临床的长期使用。

新型靶向药物包括生物制剂和小分子药物,对局部治疗抵抗的中重度 AD 患者发挥着越来越大的作用,与传统的系统治疗药物相比,这些新的生物疗法显示出更好的风险-效益比,而这些药物的治疗效果也有助于我们更深入地理解 AD 错综复杂的免疫学机制。表 2 汇总了目前用于 AD 治疗的新型靶向药物相关信息。

安全性方面,巴瑞替尼、阿布昔替尼、乌帕替尼等 JAK 抑制剂均被美国食品药品监督管理局(FDA)给予黑框警告,包括:① 发生严重感染的风险,严重细菌、真菌、病毒和机会性感染导致住院或死亡的风险增加,包括结核;② 患者的全因死亡率较高;③ 可能发生恶性肿瘤;④ 心血管死亡、心肌梗死和卒中发生率较高;⑤ 可能形成血栓等。

(三) 慢性荨麻疹 (chronic urticaria, CU)

CU 是指风团每天发作或间歇发作,持续时间 > 6 周^[34],包括慢性自发性荨麻疹 (chronic spontaneous urticaria, CSU) 和慢性诱导性荨麻疹 (chronic induced urticaria, CIndU)。目前,标准剂量或更换、增加至 2 ~ 4 倍标准剂量及联合使用第二代 H1 抗组胺药依然作为 CU 治疗的一线 and 二线方案,抗组胺药无效的患者,推荐使用雷公藤、CSA、激素、奥马珠单抗(OMZ)及光疗^[35]。

OMZ 是唯一在中国获批治疗 CU 的靶向药物,适用于 H1 抗组胺药治疗后仍有症状的成人和青少年(12 岁及以上)CSU 患者(推荐等级:A)。使用方法:每 4 周 1 次皮下注射 150 mg 或 300 mg,最大剂量为每 2 周 1 次皮下注射 600 mg。有研究表明 OMZ 对于 CIndU 如皮肤划痕症和寒冷性及日光性荨麻疹也有效,其还能用于胆碱能性荨麻疹、延迟压力性荨麻疹、热性荨麻疹、水源性荨麻疹和荨麻疹性血管炎^[36]。也有研究显示,对 CSU、CIndU 和两者皆有的患者,OMZ 治疗效果和起效速度相当^[37]。

OMZ 在特殊人群 CU 中的应用建议如下。

(1) 儿童与青少年:对于 6 ~ 12 岁患儿,基于 OMZ 已充分证明在该年龄段人群中的安全性,可在与监护人充分讨论并获得知情同意后,根据临床需求谨慎选择;对于 6 岁以下患儿,Netchiporouk 等^[38]报告 4 例使用 OMZ 治疗 CU 的儿童,4 岁和 5 岁的患儿每

表 2 治疗特应性皮炎(AD)的生物制剂和小分子靶向药物相关信息

药物名称	靶向分子	国外获批情况 (截至 2024 年 9 月)	国内获批情况 (截至 2024 年 9 月)	推荐等级 ^a	剂量及使用方法
度普利尤单抗 (dupilumab)	IL-4R α	2017 年 FDA 批准,现批准用于 治疗 6 个月及以上的儿 童 和 成 人 中 重 度 AD 患 者	2020 年 NMPA 批准,现批准用于 治疗外用药物控制不佳或不建议使 用外用药物 的 6 个月及以上的儿童 青少年和成人中重度 AD 患者	A	成人:初始剂量 600 mg (300 mg 皮下注射 2 次),此后 300 mg 每 2 周 1 次。6 个月至 5 岁儿童:体重 5 ~ < 15 kg,初始 200 mg 皮下注射,此后 200 mg 每 4 周 1 次;15 ~ < 30 kg,初始 300 mg 皮下注射,此后 300 mg 每 4 周 1 次。6 ~ 17 岁儿童:体重 15 ~ < 30 kg,初始 600 mg (300 mg 皮下注射 2 次),此后 300 mg 每 4 周 1 次;30 ~ < 60 kg,初始 400 mg (200 mg 注射 2 次),此后 200 mg 每 2 周 1 次;体重 60 kg 及以上,初始 600 mg (300 mg 皮下注射 2 次),此后 300 mg 每 2 周 1 次
司普奇拜单抗 (stapokibart)	IL-4R α	暂未获批	2024 年 NMPA 批准用于 治疗外用药物控制不佳或不 适合外用药物治疗的成人中 重度 AD 患者	B	成人:初始剂量 600 mg (300 mg 皮下注射 2 次),此后 300 mg,每 2 周 1 次
曲罗芦单抗 (tralokinumab)	IL-13	2021 年 FDA 和 EMA 批准,现批准用于 治疗 12 岁及以上青少年和成人中重度 AD 患者	暂未获批	C	成人:初始剂量为 600 mg (150 mg 皮下注射 4 次),此后 300 mg 每 2 周 1 次(150 mg 皮下注射 2 次)
来瑞组单抗 (lebrikizumab)	IL-13	2023 年 EMA 批准,现批准用于 体重 $\geq$ 40 kg 的 12 岁及以上青少年 和成人中重度 AD 患者	暂未获批	C	12 岁及以上且体重至少 40 kg 青少年和成人:初始剂量 500 mg (250 mg 皮下注射 2 次),分别 在第 0 周和第 2 周进行,维持剂量为 250 mg,每 2 周 1 次,直至第 16 周或获得 足够的临床反应,长期维持剂量为 250 mg,每 4 周 1 次
奈莫利珠单抗 (nemolizumab)	IL-31R α	2022 年在日本批准,现用于 治疗 13 岁以上儿童和成人 与 AD 相关的瘙痒	暂未获批	C	治疗剂量 60 mg 皮下注射,每 4 周 1 次
奥马珠单抗 (omalizumab)	IgE	超适应证用药	超适应证用药	C	临床研究和病例系列报道的剂量方案为 150 ~ 450 mg 每 2 ~ 4 周 1 次,皮下注射,最大剂量为 600 mg,每 2 周 1 次
乌帕替尼 (upadacitinib)	JAK1	2021 年 EMA 批准,现用于 治疗 12 岁及以上中重度 AD 患者	2022 年 NMPA 批准,现批准用于 治疗对其他系统治疗(如糖皮质激素或生物制剂) 应答不佳或不适宜上述治疗的 12 岁及以上青少年 和成人的难治性、中重度 AD 患者	A	12 岁及以上且体重 $\geq$ 40 kg 的青少年和不超过 65 岁的成人:起始剂量 15 mg 每日 1 次口服;如应答不佳可增加至 30 mg 每日 1 次,如 30 mg 剂量未达到充分应答,应停用;应使用最低有效剂量维持应答 65 岁及以上成人:推荐剂量为 15 mg,每日 1 次
阿布昔替尼 (abrocitinib)	JAK1	2022 年 FDA 批准,现用于 治疗 12 岁及以上的中重度 AD 患者	2022 年 NMPA 批准,现批准用于 治疗 12 岁及以上青少年和成人中重度 AD 患者	A	12 岁及以上青少年和成人:常规推荐剂量 100 mg,每日 1 次口服;如未实现充分应答,可将剂量增加至 200 mg,每日 1 次;对无明显禁忌的 65 岁以下成年患者,亦可考虑 200 mg,每日 1 次口服,迅速改善症状,治疗 12 周后降至 100 mg 每日 1 次,维持应答;用药 12 周如仍未达到充分应答,应停用
巴瑞替尼 (baricitinib)	JAK1/2	2020 年 EMA 批准,现用于 治疗成人中重度 AD 患者	暂未获批	C	推荐剂量为 4 mg,每日 1 次口服;根据患者皮损改善情况可减量至 2 mg,每日 1 次维持治疗。如果治疗 8 周仍未获得治疗应答,应考虑停药
迪高替尼软膏 (delgocitinib)	JAK1/2/3、TYK2	2020 年在日本批准,用于 局部治疗 16 岁以上轻中度 AD 患者	暂未获批	C	局部涂抹给药,每日 2 次,每次不超过 5 g

续表 2

药物名称	靶向分子	国外获批情况 (截至 2024 年 9 月)	国内获批情况 (截至 2024 年 9 月)	推荐等级 ^a	剂量及使用方法
芦可替尼乳膏 (ruxolitinib)	JAK1/2	2021 年 FDA 批准,用于 12 岁及以上轻中度 AD 患者	暂未获批	C	局部涂抹给药,每日 2 次,涂抹面积不超过体表面积 20%,每周用量不得超过 60 g
克立硼罗软膏 (crisaborole)	PDE-4	2016 年 FDA 批准,现批准用于 3 月龄以上儿童及成人轻中度 AD 患者	2020 年 NMPA 批准,现批准用于 3 月龄以上儿童及成人轻中度 AD 患者	A	局部涂抹给药,每日 2 次。达到临床效果后可减为每日 1 次

注:IL,白细胞介素;IgE,免疫球蛋白 E;JAK,Janus 激酶;TYK,酪氨酸激酶;PDE,磷酸二酯酶;FDA,美国食品药品监督管理局;EMA,欧洲药品管理局;NMPA,国家药品监督管理局;^a参考中国中重度 AD 诊疗临床路径专家共识(2023 版)^[33]、国内外临床研究数据及专家经验确定推荐等级

月接受 150 mg 剂量,而 10 岁和 16 岁患者每月接受 300 mg 剂量,这 4 例患者均获得完全缓解,未报告不良事件。(2)妊娠期及哺乳期妇女:一项前瞻性研究纳入 250 例在妊娠前 8 周内或妊娠期间因过敏性哮喘使用过 OMZ 的妇女,未发现 OMZ 对胎儿或新生儿产生不良影响。本共识推荐可根据实际情况对有临床需求的妊娠期或哺乳期妇女进行风险获益分析,在充分知情同意情况下,可考虑使用 OMZ。(3)老年患者:老年(> 65 岁)患者使用 OMZ 的数据有限,尚无证据表明老年患者的使用剂量与 65 岁以下的成人患者有差异^[39]。

(四)结节性痒疹(prurigo nodularis,PN)

PN 是慢性痒疹的一种亚型,是一种慢性、严重瘙痒性皮肤病,临床特征为淡红色至鲜红色结节,表面角化明显,可见表皮剥蚀及结痂^[40]。目前 PN 一般治疗包括外用保湿润肤剂、寻找病因、治疗基础疾病及心理支持等,针对潜在的免疫和神经失调的治疗方法包括外用药物、光疗、系统神经调节治疗和系统应用免疫调节药物^[41-43]。

目前,一些治疗 PN 的靶向药物已获批或正处于临床试验阶段,主要是针对 Th2 型炎症的生物制剂及小分子靶向药物,如抗 IL-4/IL-13、IL-31、抑瘤素 M(oncostatin M,OSM)和 IgE 等的单克隆抗体,酪氨酸激酶 KIT 受体抑制剂和 JAK 抑制剂^[41-43]。

1. 度普利尤单抗:2022 年 9 月度普利尤单抗在美国获批用于治疗成人 PN,2023 年 9 月中国国家药品监督管理局(NMPA)批准适用于成人中度至重度 PN 患者(推荐等级:A)。使用方法:首次 600 mg 皮下注射,此后每 2 周 1 次皮下注射 300 mg。长期耐受性良好,常见的不良反应(发生率 ≥ 2%)是鼻咽炎、结膜炎、疱疹感染、头晕、肌痛和腹泻。

2. 奈莫利珠单抗:奈莫利珠单抗是一种人源化抗人 IL-31 受体 α 单克隆抗体,抑制 IL-31 与其受体结合。2019 年 11 月,奈莫利珠单抗治疗 PN 相关瘙

痒已获得 FDA 突破性药物的资格。奈莫利珠单抗治疗中重度 PN 的 II 期多中心随机双盲安慰剂对照试验现已完成,在基线、第 4 周和第 8 周皮下注射奈莫利珠单抗(0.5 mg/kg),结果显示,在单次皮下注射后第 4 周,奈莫利珠单抗治疗组瘙痒症状改善 53%,安慰剂组为 20.2%^[44]。2024 年 8 月 FDA 正式批准其适用于成人 PN(推荐等级:C)。

(五)慢性光化性皮炎(chronic actinic dermatitis,CAD)

CAD 是以在曝光和非曝光部位出现慢性、持续性炎症性皮损、光敏感为特征的病谱性疾病,包括持久性光反应、光敏性湿疹、光敏性皮炎、光线性类网织细胞增多症,病谱的两端分别是光敏性皮炎和光线性类网织细胞增多症。局部治疗主要有外用激素和外用钙调磷酸酶抑制剂等。对于病情较重或外用药物效果不佳的患者,可以使用系统药物,如烟酰胺、羟氯喹、沙利度胺等。在急性期,可加用小剂量激素或免疫抑制剂。

国内外多篇文献报道 CAD 患者接受度普利尤单抗治疗后症状明显缓解^[45-47],具有良好安全性^[46]。使用方法:推荐成人患者使用本品的初始剂量为 600 mg,继以每 2 周或每月 1 次 300 mg,皮下注射(推荐等级:C)。

三、大疱性皮肤病

(一)寻常型天疱疮(pemphigus vulgaris,PV)

PV 是一种少见的由自身抗体介导的自身免疫性大疱性皮肤病,临床表现为皮肤和黏膜表面水疱、大疱、糜烂等,严重影响患者的生活质量甚至可能危及生命。PV 的传统治疗包括激素、免疫抑制剂、IVIG 及免疫吸附等。

利妥昔单抗(rituximab,RTX)是一种靶向 CD20 的单克隆抗体,2018 年被 FDA 批准治疗 PV,成为

首个也是截至 2024 年 8 月唯一一个被 FDA 批准用于治疗 PV 的靶向药物,适用于成人中度至重度 PV (推荐等级:B)。RTX 能够通过消除自身反应性 B 细胞和下调特异性 CD4⁺辅助 T 细胞等作用,减少 PV 患者致病性抗体的产生,从而起到治疗作用^[48]。使用方法:目前常用类风湿性关节炎治疗方案,RTX 1 000 mg,分 2 次静脉输注,间隔 2 周。可以根据患者临床症状控制及血清学情况在 6 ~ 12 个月时再次给药以获得长期缓解。

(二)大疱性类天疱疮(bullous pemphigoid, BP)

BP 是最常见的自身免疫性大疱性疾病,主要累及老年人,儿童和青少年罕见,临床上以躯干、四肢出现张力性大疱为特点。BP 的治疗须根据患者的临床情况和疾病严重程度进行个体化指导。局部和系统应用激素是 BP 的主要治疗方法^[49]。此外,针对 BP 发病机制中特异性靶点的生物制剂也已成为 BP 的重要疗法。

1. RTX:欧洲皮肤病与性病学会指南建议 RTX 作为 BP 的三线治疗^[50-51]。目前 RTX 用于 BP 治疗剂量尚未确定,多采用类风湿性关节炎治疗方案(1 000 mg 分 2 次静脉输注,间隔 2 周)和淋巴瘤方案(375 mg/m²体表面积,每周 1 次,连续 4 周)^[52-53],研究表明这两种方案治疗 BP,疗效无明显差异^[53]。RTX 可作为难治性 BP 的三线治疗选择(推荐等级:B),同时 RTX 和激素的联合治疗可在减少激素剂量且不增加不良反应发生率的基础上,显著提高患者的完全缓解率。

2. 度普利尤单抗:度普利尤单抗不仅阻断 IL-4 和 IL-13 介导的信号转导,而且还抑制嗜酸性粒细胞分泌 IL-31^[54]。研究显示,度普利尤单抗可成功用于治疗难治性 BP,特别是用于缓解难治性瘙痒^[55]。难治性 BP 患者采用 AD 用药方案,即首次皮下注射度普利尤单抗 600 mg,然后每 2 周皮下注射 300 mg(推荐等级:C),但部分患者只能部分控制病情,因此用药频率大多改为每周 1 次,且每周治疗的频率似乎更有利于缓解^[56]。

3. OMZ:OMZ 可以阻止 IgE 与肥大细胞和其他效应细胞上的 FcεR I 相互作用,通过结合到游离 IgE 的 Fc 区域来减少炎症介质的释放,下调 FcεR I 表达并解离 IgE-FcεR I 复合物。2009 年 OMZ 首次成功治疗 1 例难治性 BP 患者^[57]。共 16 篇病例报道报告 OMZ 治疗难治性 BP 的疗效,结果显示大多数患者可受益于 OMZ 治疗(皮下注射 300 mg/次,每 4 周 1 次)(推荐等级:C),维持时间各不同(长达

18 个月),并且没有严重的不良反应^[58-59]。在目前的病例报告中,RTX 和 OMZ 治疗难治性 BP 显示了积极的治疗结果,但其疗效和安全性尚需在大规模临床试验中证实。

对于常规治疗抵抗的患者来说,生物制剂是新的治疗选择。RTX、OMZ 和度普利尤单抗已成功应用于临床,且针对不同机制的新生物制剂的临床试验已逐步开展,例如美泊利单抗、乌司奴单抗、柏替木单抗、贝那利珠单抗、艾朵利单抗、BIVV009 (sutimlimab)等,其中鉴于 I 期试验的成功,FDA 于 2017 年 8 月将 BIVV009 指定为 BP 的孤儿药^[60]。

(三)获得性大疱性表皮松解症(epidermolysis bullosa acquisita, EBA)

EBA 又称表皮松解型类天疱疮,是一种慢性、自身免疫性大疱性皮肤病,临床表现为水疱、大疱及黏膜损害。EBA 的传统治疗药物主要包括系统应用激素、免疫抑制剂(主要包括 CSA、MTX、MMF、环磷酰胺、AZA、秋水仙碱及氨苯砒等)及 IVIG 等。

RTX 在 EBA 患者中也取得很好的疗效^[61-62]。传统药物治疗效果不佳或治疗后反跳的 EBA 患者可能对 RTX 治疗更加敏感(推荐等级:C)。使用方法:RTX 治疗 EBA 以淋巴瘤及类风湿性关节炎的治疗方案为主。淋巴瘤方案为 375 mg/m²(体表面积),每周 1 次,连续 4 周。类风湿性关节炎方案为第 1 天和第 15 天给药,给药剂量为 500 mg/次(低剂量方案)或 1 000 mg/次(高剂量方案)^[63]。上述两种治疗方案对 EBA 均有较好的疗效,但研究显示类风湿性关节炎与自身免疫性大疱病中的 B 细胞生物学行为模式更为相似^[64-65],所以类风湿性关节炎的治疗方案运用得更多。

(四)副肿瘤性天疱疮(paraneoplastic pemphigus, PNP)

PNP 是一种罕见的自身免疫性大疱性疾病,多种恶性肿瘤及淋巴增生性疾病与 PNP 相关^[66]。PNP 治疗反应差,患者常死于合并症,如肺部受累的呼吸衰竭。

目前临床上用于治疗 PNP 的靶向生物制剂主要为抗 CD20 的单克隆抗体,如 RTX、奥妥珠单抗^[67]。抗 CD20 单抗用于治疗 PNP 主要为个案报道,其中以 RTX 报道最多,部分患者经 RTX 治疗后 PNP 可成功控制,且得到长期良好预后,但部分文献报道患者对其治疗反应不佳^[67-69]。奥妥珠单抗为第 3 代 Fc 段经修饰的 II 型 CD20 单抗,具有更强的直接 B 细胞杀伤效应,目前有文献报道奥妥珠单

抗联合苯达莫司汀可成功治疗与滤泡性淋巴瘤相关的 PNP 及闭塞性细支气管炎患者^[70]。此外,也有文献报道用抗 CD52 单克隆抗体阿仑珠单抗(alemtuzumab)治疗 PNP,该单抗可同时靶向 T 和 B 淋巴细胞,诱导细胞死亡并抑制淋巴细胞增生^[66]。使用方法:RTX 及奥妥珠单抗用于治疗 PNP 的方案与其在相应血液系统肿瘤中治疗的推荐方案一致。RTX 成人剂量建议 375 mg/m²体表面积,静脉滴注,每周 1 次,连续 4 周;奥妥珠单抗建议 1 g/次,每 28 天 1 次,静脉滴注,共 6 次,同时应根据患者是否合并血液系统肿瘤及其病情进行疗程调整及联合化疗或其他药物治疗,如经苯达莫司汀治疗,滤泡性淋巴瘤达到完全或部分缓解的 PNP 患者继续接受奥妥珠单抗(1 000 mg)单药维持治疗每 2 月 1 次,直至疾病进展或最长 2 年。

四、结缔组织病

(一) 系统性红斑狼疮(systemic lupus erythematosus, SLE)

SLE 是一种以免疫系统异常激活和自身抗体增多为特征的自身免疫性疾病,可累及多个器官或系统。SLE 目前可用的传统治疗方法有限,主要以激素、免疫抑制剂、抗疟药为主;目前国内外获批用于治疗 SLE 的靶向药物有 3 种:贝利尤单抗(belimumab)、泰它西普(telitacicept)、阿尼鲁单抗(anifrolumab),另外临床上常用的超适应证用药还包括 RTX(表 3)。

1. 贝利尤单抗:是全球首个批准用于治疗 SLE 的靶向药物,靶向 B 淋巴细胞刺激因子,NMPA 批准适用于常规治疗基础上仍无法控制(例如:抗双链 DNA 抗体阳性及低补体、SELENA-SLEDAI 评分 ≥ 8)的活动性、自身抗体阳性的 5 岁及以上 SLE

患者。使用方法:静脉输注,10 mg/kg,前 3 次每 2 周给药 1 次,随后每 4 周给药 1 次。用药期间应持续评估患者的病情,如果治疗 6 个月后病情没有改善,应考虑中止治疗。

2. 泰它西普:是我国自主研发的双靶点生物制剂,2021 年被 NMPA 批准用于治疗 SLE。泰它西普与常规治疗联合,适用于在常规治疗基础上仍具有高疾病活动度(抗双链 DNA 抗体阳性及低补体、SELENA-SLEDAI 评分 ≥ 8)的活动性、自身抗体阳性的成年 SLE 患者。使用方法:推荐使用剂量为 160 mg/次,每周 1 次,腹部皮下注射。给药期间应评估耐受性,如需下调剂量可将每次给药剂量下调为 80 mg/次。

3. 阿尼鲁单抗:是一种 I 型干扰素受体拮抗剂,FDA 批准阿尼鲁单抗用于治疗正在接受标准治疗的中重度 SLE[SLE 疾病活动性指数 2 000(SLEDAI-2 000) ≥ 6]成人患者,我国尚未批准。使用方法:300 mg/次,每 4 周 1 次,静脉输注,输注时间为 30 min。

4. RTX:RTX 通过耗竭 SLE 患者体内 B 细胞,从而减少自身抗体的产生,其在治疗 SLE 患者中的作用仍然存在争议。根据国内外指南建议^[72-73],对于顽固性狼疮肾炎和血液系统受累(血小板减少症或自身免疫性溶血性贫血)的 SLE 患者,如果激素、IVIG 和免疫抑制剂治疗均无效,可考虑使用 RTX 治疗。使用方法:静脉输注,推荐使用剂量为 1 000 mg/次,两次为 1 个疗程,间隔 2 周。两个疗程之间应至少间隔 6 个月。

(二)硬皮病(scleroderma)

硬皮病是一种慢性结缔组织疾病,分为局限性硬皮病(LoS,即硬斑病)和系统性硬化症(SSc),病变涉及皮肤和内脏器官,以异常的免疫反应、血管损伤、胶原增生和纤维化为特征。硬皮病的传统治疗方案主要针对炎症、纤维化和血管功能障碍,包括系统和局部治疗。系统治疗包括激素、免疫抑制剂等,局部治疗包括外用免疫调节剂、紫外线光疗等。近年来,随着靶向治疗的应用,酪氨酸激酶抑制剂(TKI)尼达尼布和人 IL-6 抑制剂托珠单抗被批准用于 SSc,具体治疗如下:

1. 尼达尼布(nintedanib):尼达尼布是一种小分子酪氨酸激酶抑制剂,可通过竞争性抑制成纤维细胞生长因子受体、血小板生长因子受体、血管表皮生长因子受体等受体酪氨酸激酶,阻断对成纤维细胞的增殖、迁移和转换起关键作用的细胞信号转

表 3 治疗系统性红斑狼疮的生物制剂

药物名称	靶向分子	获批情况	推荐等级 ^a
贝利尤单抗	BlyS	2011 年 FDA 批准; 2019 年 NMPA 批准	A
泰它西普	BlyS/APRIL 双靶点	2021 年 NMPA 批准	A
阿尼鲁单抗	I 型干扰素受体	2021 年 FDA 批准	B
利妥昔单抗	CD20	未获批,超适应证	C

注:BlyS,B 淋巴细胞刺激因子;APRIL,增殖诱导配体;FDA,美国食品药品监督管理局;NMPA,国家药品监督管理局;^a参考生物制剂在系统性红斑狼疮中应用的中国专家共识(2024 版)^[71]及编写的专家经验

导,从而抑制异常纤维化。目前,尼达尼布已获得 NMPA 批准,成为首个也是目前唯一适用于 SSc 相关间质性肺疾病的药物^[74](**推荐等级:B**)。使用方法:150 mg/次,每日 2 次,给药间隔大约为 12 h。应与食物同服,用水送服整粒胶囊,不得咀嚼或碾碎服用。

2. 托珠单抗(tocilizumab, TCZ):TCZ 是一种重组人源化抗人 IL-6 受体单克隆 IgG 抗体,通过与 IL-6 受体结合,抑制 IL-6 介导的炎症反应和纤维化^[75]。FDA 已批准 TCZ 皮下注射液用于延缓 SSc 相关间质性肺病及肺功能下降,为 FDA 批准的第一款用于治疗 SSc 相关间质性肺病的生物制剂(**推荐等级:B**)。使用方法:162 mg/次,每周 1 次,皮下注射。

(三) 皮肤炎(dermatomyositis)

皮肤炎是特发性炎症性肌病(idiopathic inflammatory myopathies, IIM)的一种亚型。目前治疗皮肤炎的主要方案仍是大剂量激素,必要时联合免疫抑制剂治疗,如 MTX、烷化剂 CTX、AZA、CSA、MMF 及他克莫司等。在难治性病例中,使用 IVIG 可能有效^[76]。

2020 年 Waldman 等推荐^[77],对于成人中度皮肤炎可用 RTX 治疗,对于重度皮肤炎推荐系统应用激素联合 RTX 为一线治疗(**推荐等级:B**)。使用方法:每周静脉滴注 RTX 1 000 mg/次,持续 2 周。2018 年 Selva-O'Callaghan 等建议^[78],对于严重的炎症性肌病,可使用激素联合 RTX。在难治性病例中,可使用其他生物制剂,如阿巴西普(**推荐等级:C**)和 TCZ(**推荐等级:C**)。使用方法:①RTX:静脉滴注,共 2 次,1 000 mg/次,间隔 2 周,后根据患者的临床情况及 CD19、CD20 计数使用 1 剂或 2 剂 0.5 ~ 1 g RTX 维持治疗,每 6 ~ 9 个月给药 1 次;②阿巴西普:对于体重 60 ~ 100 kg 的病例,每 4 周静脉滴注 750 mg(若体重 < 60 kg,则改为 500 mg;如果体重 > 100 kg,则为 1 000 mg);③TCZ:每 4 周静脉滴注 8 mg/kg 或者每周 162 mg,皮下注射。

(四) 干燥综合征(Sjögren's syndrome, SS)

SS 是一种慢性多系统自身免疫性疾病,特征为泪腺和唾液腺炎症及其导致的眼干和口干,偶尔可见腺体增大^[79]。药物治疗选择根据器官受累情况和疾病严重程度而有所不同。治疗药物通常包括激素、羟氯喹、传统抗风湿药(如 MTX、来氟米特、AZA、柳氮磺吡啶、MMF、CSA)以及其他强效免疫抑制剂(CTX)等。

SS 基金会专家组制订了有关生物制剂使用的临床实践指南^[80-81],该指南中可使用的生物制剂包括 TNF- α 抑制剂和 RTX,具体推荐意见如下:TNF- α 抑制剂不推荐用于治疗原发性 SS(primary Sjögren's syndrome, pSS)患者的干燥症状,当 SS 合并类风湿性关节炎、具有治疗炎症性关节炎指征或其他重叠疾病时,可视病情使用 TNF- α 抑制剂,但是医生需要警惕并监视药物毒性作用(**推荐等级:C**)。尽管理论上存在 SS 易合并淋巴瘤的问题,但尚无证据表明 SS 合并类风湿性关节炎患者使用 TNF- α 抑制剂会增加罹患淋巴瘤的风险。使用方法:依那西普 25 mg 每周 2 次(间隔 72 ~ 96 h)或 50 mg 每周 1 次,皮下注射。RTX 可考虑作为干燥性角结膜炎以及传统治疗(包括局部保湿剂、促分泌剂、抗炎药、免疫调节剂及泪小点封闭)无效的 pSS 患者的治疗选择(**推荐等级:C**)。RTX 也可用于有残余唾液腺、经由临床医师确诊的严重口腔损害以及传统治疗(局部保湿剂、促分泌剂)无效的口干症患者。RTX 可能用于成人 pSS 和有以下任何系统表现的 SS:血管炎(有或无冷球蛋白血症)、严重的腮腺肿胀、炎性关节炎、肺疾病或周围神经病(尤其是多发性单神经炎)。使用方法:RTX 在不同研究中用药剂量和用药疗程有所不同,报道较多的方案为每周或每 2 周 200 ~ 500 mg 静脉滴注,持续 1 ~ 3 次。首次治疗后复发患者,经评估后可再次治疗,不推荐 RTX 减量使用。

(五) 混合性结缔组织病(mixed connective tissue disease, MCTD)

MCTD 是一种血清中有高滴度斑点型抗核抗体和抗 U1RNP(nRNP)抗体,临床上表现为雷诺现象、肢端硬化、双手肿胀、滑膜炎、多关节痛或关节炎、食管运动功能障碍、肌炎、肺动脉高压等特征的临床综合征。MCTD 尚无相关临床试验以指导治疗,通常是依据对 SLE、多发性肌炎/皮肌炎、类风湿性关节炎和 SSc 中类似临床症状的处理进行治疗^[82]。

MCTD 相关的靶向药物治疗目前在相关指南或共识中尚未见报道。英国一项随机对照试验证实,RTX 是治疗难治性结缔组织病(如 MCTD、SSc 或特发性炎症性肌炎等)相关间质性肺病的有效疗法^[83-84](**推荐等级:C**)。来自中国的临床研究证实,小剂量 RTX 在治疗 MCTD、SLE 和 SS 引起的难治性血小板减少症和自身免疫性溶血性贫血方面显示出良好且快速的疗效^[85-86]。使用方法:RTX 在不同

研究中用药剂量和用药疗程有所不同,报道较多的方案为每周或每 2 周 200 ~ 500 mg 静脉滴注,持续 1 ~ 3 次^[85],小剂量为 100 mg,每周 1 次,共 4 周,常联合激素类药物治疗^[86]。RTX 长期治疗 MCTD 数据有限,首次治疗后复发患者,经评估后可再次治疗。

(六)成人斯蒂尔病(adult-onset Still's disease, AOSD)

AOSD 是一种自身炎症性疾病,发病率为 0.2/10 万 ~ 0.4/10 万,女性多见,主要累及青年人,典型表现为间歇性发热、关节痛、一过性皮疹^[87]。目前对 AOSD 公认的一线治疗方案是非甾体抗炎药及激素,对激素治疗无效或激素依赖者,则需加用改善病情的抗风湿药(disease modifying antirheumatic drug, DMARD)。MTX 是 AOSD 患者中使用最多的 DMARD,其他一些免疫抑制剂,如 CSA、来氟米特、他克莫司、羟氯喹、AZA 等亦可酌情应用。

重组人源化抗 IL-1 β 单克隆抗体可特异性与 IL-1 β 结合,抑制 IL-1 β 活性。在欧洲,重组人源化抗 IL-1 β 单克隆抗体被批准用于治疗 AOSD。卡那单抗(canakinumab)是一种人源性抗 IL-1 β 单克隆抗体,研究表明卡那单抗治疗 AOSD 与全身性幼年特发性关节炎具有相似的有效性和安全性^[88-90],2020 年 FDA 批准其用于 2 岁及以上 AOSD 患者的治疗(推荐等级:B)。使用方法:对于 ≥ 7.5 kg 的患者,推荐基于体重 4 mg/kg(最大剂量为 300 mg),每 4 周皮下注射 1 次。低于 7.5 kg 的患者使用方法暂缺乏相关证据支持。

五、皮肤肿瘤

(一)黑色素瘤(melanoma)

黑色素瘤是一种恶性程度极高的皮肤肿瘤,全球每年新发病例超过 20 万,侵袭性强,易通过血液、淋巴系统向远处转移,扩散至淋巴结和肝、肺、脑等其他器官,转移性疾病是黑色素瘤致死的主要原因^[91]。现阶段的主要治疗方案仍是手术切除,早期黑色素瘤仅通过手术即可成功治疗且具有较高的存活率,若患者发生转移则存活率显著下降^[92-93]。转移性黑色素瘤的系统治疗选择包括化疗、分子靶向治疗和免疫治疗。

近年来,随着丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶(serine/threonine-protein kinase B-Raf, BRAF)、细胞毒性 T

淋巴细胞相关蛋白 4(cytotoxic T-lymphocyte associated protein 4, CTLA4)和程序性死亡受体 1(programmed death 1, PD-1)抑制剂等治疗方法的引入,7 种新的药物和/或方案被 NMPA 批准用于治疗不能切除的 III 和 IV 期黑色素瘤,转移性黑色素瘤的预后有了很大改善,但存在价格昂贵、反应率低、不良反应严重等局限性^[93-96]。

1. PD-1 抑制剂:2018 年至今, NMPA 已批准 3 种抗 PD-1 单抗用于不可切除或转移性黑色素瘤的二线治疗,分别为帕博利珠单抗(pembrolizumab)、特瑞普利单抗(toripalimab)和普特利单抗(pucotenlimab)。帕博利珠单抗适用于经一线治疗失败的不可切除或转移性黑色素瘤的治疗(推荐等级:A)。特瑞普利单抗注射液适用于既往治疗失败后不可切除或转移性黑色素瘤(推荐等级:A)。普特利单抗注射液适用于不可切除或转移性的高度微卫星不稳定型(MSI-H)的黑色素瘤患者(推荐等级:A)。

2. BRAF 抑制剂:对于黑色素瘤人群,研究发现高加索人群中约 50% 发生 BRAF 突变^[97],中国人群 25.5% 发生 BRAF 突变^[98],针对 BRAF 突变的靶向药物治疗延长了黑色素瘤患者的生存期。目前 FDA 批准用于 BRAF V600E 突变的靶向治疗药物为:①维莫非尼:NMPA 批准其用于经 NMPA 批准的检测方法确定的 BRAF V600 突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤(推荐等级:A);②达拉非尼:联合曲美替尼适用于治疗 BRAF V600 突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤患者和 III 期黑色素瘤患者完全切除后的辅助治疗(推荐等级:A)。此类药物应用前须经 NMPA 批准的检测方法进行 BRAF V600 突变检测,确认为 BRAF V600 突变阳性的患者方可接受该类药物治疗,不适用于 BRAF 野生型黑色素瘤患者。

3. 丝裂原活化的细胞外信号调节激酶(mitogen-activated extracellular signal-regulated kinase, MEK)抑制剂:选择性 MEK 抑制剂能够抑制 BRAF 和 NRAS 突变细胞系生长和诱导肿瘤细胞死亡,从而发挥抗肿瘤作用。如曲美替尼、考比替尼、比美替尼、妥拉美替尼等 MEK 抑制剂已先后于国内上市,这些药物单用或与相应的 BRAF 抑制剂联用均可明显改善黑色素瘤患者预后,已成为国内外多个指南中针对存在 BRAF V600 基因突变的黑色素瘤患者的一线新辅助治疗选择之一(推荐等级:B)。其中,妥拉美替尼用于治疗 NRAS 突变的晚期

黑色素瘤,适用于含抗 PD-1/PD-L1 治疗失败的伴 NRAS 突变的晚期黑色素瘤患者,是全球首个获批针对 NRAS 突变晚期黑色素瘤适应证的 MEK 抑制剂,被纳入中国临床肿瘤协会黑色素瘤诊疗指南 I 级推荐。

4. CTLA-4 抑制剂:近年来,CTLA-4 成为抗肿瘤免疫反应的潜在治疗靶点,阻断 CTLA-4 为抗肿瘤免疫治疗提供了新思路。目前,FDA 批准伊匹木单抗用于治疗不可切除或转移性黑色素瘤(推荐等级:B)。伊匹木单抗是第一种在黑色素瘤显示出生存获益的免疫药物。单一用药时,伊匹木单抗较 PD-1 抑制剂未能显示出更好的疗效与更低的毒性;相较于单独用药,联合免疫疗法(即伊匹木单抗与 PD-1 抗体联合)可以提高有效率,延长无进展生存期和总生存期,但也可能增加不良反应风险。

5. 淋巴细胞活化基因 3(lymphocyte activation gene-3,LAG-3)抑制剂:LAG-3 和 PD-1 是两个不同的抑制性免疫检查点,通常在肿瘤浸润淋巴细胞上共同表达,从而导致肿瘤介导的 T 细胞衰竭。纳武利尤单抗(抗 PD-1)和瑞拉利单抗(抗 LAG-3)联合使用比单独使用任何一种抗体的活性都能增加 T 细胞的活性。FDA 批准 Opdualag(瑞拉利单抗+纳武利尤单抗)固定剂量复方组合用于治疗成人和 12 岁以上青少年(体重≥40 kg)的不可手术切除或转移性黑色素瘤(推荐等级:B)。

针对不同免疫治疗方案治疗黑色素瘤的研究显示,经过至少 60 个月随访,接受纳武利尤单抗+伊匹木单抗联合治疗方案的患者生存期中位数超过 60.0 个月,单药纳武利尤单抗组为 36.9 个月,而

单药伊匹木单抗组为 19.9 个月^[99-100]。因此,在临床应用中应权衡用药利弊以争取最大治疗效益。另外,肿瘤原发部位、年龄、肿瘤转移等多种因素也可影响肿瘤治疗效果^[101-103]。

根据《新型抗肿瘤药物临床应用指导原则(2023 年版)》^[104]、2021 中国临床肿瘤协会(CSCO)黑色素瘤诊疗指南^[105],相关靶向治疗药物具体使用方法参见表 4。

(二)原发性皮肤淋巴瘤(primary cutaneous lymphoma)

原发性皮肤淋巴瘤是一组异质性 T 细胞和 B 细胞肿瘤,在临床表现、组织学表现、免疫表型和预后方面存在显著差异。皮肤 T 细胞淋巴瘤(cutaneous T cell lymphoma,CTCL)是一组异质性皮肤归巢 T 细胞肿瘤,其中蕈样肉芽肿(mycosis fungoides,MF)和原发性皮肤 CD30⁺淋巴细胞增生性疾病约占 CTCL 的 90%^[106]。CTCL 的传统系统治疗包括小剂量 MTX、维 A 酸类、干扰素 α 等,皮肤定向治疗包括激素、化疗(氮芥或卡莫司汀)、维 A 酸、咪喹莫特、放疗(X 射线或电子束)、光疗(中波紫外线或补骨脂素联合长波紫外线)和全身皮肤电子束治疗等。随着靶向药物的兴起,叶酸代谢抑制剂、组蛋白脱乙酰化酶抑制剂及抗 CD30 单抗等被发现可用于治疗不同类型原发性皮肤淋巴瘤,并陆续获批使用。

1. 叶酸代谢抑制剂:普拉曲沙是叶酸类似物代谢抑制剂,可竞争性抑制二氢叶酸还原酶,对叶酸载体类型 1 具有高亲和力,而肿瘤细胞过度表达叶酸载体类型 1,因此普拉曲沙对肿瘤细胞具有更高

表 4 治疗黑色素瘤的靶向药物相关信息

药物	靶点	国外获批情况 (截至 2024 年 9 月)	国内获批情况 (截至 2024 年 9 月)	治疗方案	推荐 等级 ^a
帕博利珠单抗	PD-1	2014 年 FDA 批准用于经一线治疗失败的不可切除或转移性黑色素瘤的治疗	2018 年 NMPA 批准用于经一线治疗失败的不可切除或转移性黑色素瘤的治疗	帕博利珠单抗单药方案:200 mg 或 2 mg/kg,每 3 周 1 次,静脉输注(30 min 以上),直至疾病进展或者出现不可耐受的毒性或者满 2 年	A
特瑞普利单抗	PD-1	暂未获批	2018 年 NMPA 批准用于既往治疗失败后不可切除或转移性黑色素瘤	特瑞普利单抗单药方案:3 mg/kg,每 2 周 1 次,静脉输注(至少 60 min),直至疾病进展或者出现不可耐受的毒性或者满 2 年	A
普特利单抗	PD-1	暂未获批	2022 年 NMPA 批准用于不可切除或转移性的高度微卫星不稳定型(MSI-H)的黑色素瘤患者	普特利单抗单药方案:200 mg,静脉滴注,输液时间为 60 min(±15 min),每 3 周给药 1 次,直到疾病进展或者出现不可耐受的毒性	A
纳武利尤单抗	PD-1	2017 年 FDA 批准用于辅助治疗接受完全切除后累及淋巴结或出现转移的黑色素瘤患者	暂未获批	纳武利尤单抗单药方案:3 mg/kg,每 2 周 1 次,静脉输注(时间 30 min),直至疾病进展或者出现不可耐受的毒性或者满 2 年	B

续表 4

药物	靶点	国外获批情况 (截至 2024 年 9 月)	国内获批情况 (截至 2024 年 9 月)	治疗方案	推荐 等级 ^a
维莫非尼	BRAF	2011 年 8 月 FDA 批准用于治疗具有 BRAF V600E 突变的晚期或转移性黑色素瘤患者	2017 年 3 月, 适用于治疗经 NMPA 批准的检测方法确定的 BRAF V600 突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤	肢端/皮肤黑色素瘤术后辅助治疗: 维莫非尼单药: 960 mg, 每日 2 次, 坚持 1 年。肢端/皮肤黑色素瘤晚期辅助治疗: 维莫非尼单药: 960 mg, 每日 2 次, 直至进展或不能耐受	A
达拉非尼	BRAF	2013 年 5 月 FDA 批准用于治疗黑色素瘤	2019 年 12 月 NMPA 批准达拉非尼联合曲美替尼用于治疗 BRAF V600 突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤; 2020 年 3 月, NMPA 批准达拉非尼联合曲美替尼用于 BRAF V600 突变阳性的 III 期黑色素瘤患者完全切除后的辅助治疗	肢端/皮肤黑色素瘤晚期及术后辅助治疗: 达拉非尼联合曲美替尼: 达拉非尼 150 mg, 每日 2 次; 曲美替尼: 2 mg, 每日 1 次, 直至进展或不能耐受。黏膜黑色素瘤术后辅助治疗: 达拉非尼联合曲美替尼: 达拉非尼 150 mg, 每日 2 次; 曲美替尼: 2 mg, 每日 1 次	A
曲美替尼	MEK	2013 年 5 月 FDA 批准用于治疗不可切除或转移的 BRAF V600E 和 V600K 突变的黑色素瘤	与达拉非尼的国内获批情况相同	推荐剂量 2 mg, 每日 1 次, 空腹口服, 推荐餐前 1 h 或餐后 2 h 服用, 单用或与达拉非尼联用, 连续使用直到疾病进展或出现严重不良反应	B
考比替尼	MEK	2015 年 11 月 FDA 批准用于治疗 BRAF V600E/K 突变黑色素瘤	暂未获批	与维莫非尼联用, 以 28 d 为 1 个周期, 仅在第 1 天和第 21 天各口服 1 次, 每次 60 mg; 按周期使用直到疾病进展或出现严重不良反应	B
比美替尼	MEK	2018 年 6 月, 比美替尼在美国首次获批上市, 与康奈非尼联合用于治疗无法切除或具有 BRAF V600E 或 V600K 突变的转移性黑色素瘤	暂未获批	与恩考芬尼联用, 45 mg, 每日 2 次, 口服, 连续使用直到疾病进展或出现严重不良反应	B
妥拉美替尼	MEK	暂未获批	2024 年 3 月 NMPA 批准用于含抗 PD-1/PD-L1 治疗失败的 NRAS 突变的晚期黑色素瘤患者	每次 12 mg, 每日 2 次, 口服(约每 12 小时服用 1 次), 空腹或随餐均可	B
伊匹木单抗	CTLA-4	2011 年 3 月, FDA 批准伊匹木单抗以 3 mg/kg 剂量单药治疗不可切除或转移性黑色素瘤患者。2015 年 10 月, FDA 批准用于治疗 BRAF V600 野生型黑色素瘤。2016 年 1 月, FDA 批准扩大适应证, 包括 BRAF V600 野生型和 BRAF V600 突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤患者	暂未获批	作为单一药剂的推荐剂量: 每 3 周 1 次, 每次 3 mg/kg, 90 min 静脉输液, 最多 4 个疗程。如果发生毒性反应, 可延迟输注, 但所有输注应在首次输注后的 16 周内完成。对于辅助黑色素瘤治疗, 10 mg/kg 静脉注射超过 90 min, 每 3 周注射 1 次, 共 4 次; 随后, 10 mg/kg, 每 12 周注射 1 次, 为期 3 年或直到证实疾病复发或出现不可接受的毒性。对于严重的不良反应, 应永久停药	B
瑞拉利单抗	LAG-3	FDA 批准 Opdualag(瑞拉利单抗 + 纳武利尤单抗)固定剂量复方组合用于治疗成人和 12 岁以上青少年(体重 ≥ 40 kg)的不可手术切除或转移性黑色素瘤	暂未获批	纳武利尤单抗 480 mg + 瑞拉利单抗 160 mg, 每 4 周 1 次静脉输注, 适用于 12 岁以上且体重 ≥ 40 kg 的恶性黑色素瘤患者, 直至疾病进展或发生不可接受的毒性	B

注: PD-1, 程序性死亡受体 1; BRAF, 丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶; MEK, 丝裂原活化的细胞外信号调节激酶; CTLA-4, 细胞毒性 T 淋巴细胞相关蛋白 4; LAG-3, 淋巴细胞活化基因 3; FDA, 美国食品和药物管理局; NMPA, 国家药品监督管理局。^a 参考《新型抗肿瘤药物临床应用指导原则(2023 年版)》^[104]、2021 中国临床肿瘤学会(CSCO)黑色素瘤诊疗指南^[105]、国内外临床研究数据及专家经验确定推荐等级

选择性^[107]。普拉曲沙在 2009 年已获 FDA 批准用于治疗难治性 CTCL, 我国 2020 年获批用于治疗 CTCL。

2. 组蛋白脱乙酰化酶抑制剂: 组蛋白脱乙酰化酶(histone deacetylase, HDAC)催化组蛋白中乙酰化赖氨酸残基的乙酰基去除, 从而调节基因表达。HDAC 还能使转录因子等非组蛋白去乙酰化^[108]。

罗米地辛是一种 HDAC 抑制剂, 在体外实验中, 其可引起乙酰化组蛋白累积, 诱导癌细胞周期阻滞和凋亡, 对 CTCL 治疗有效^[109]。罗米地辛 2009 年经 FDA 批准, 用于系统治疗期间或之后疾病进展、持续或复发的 CTCL 患者。伏立诺他是另一种 HDAC 抑制剂, 用于 MF 患者的部分缓解率为 30%^[110-111], 该药 2006 年经 FDA 批准用于治疗在两种系统治疗

后仍进展、持续或复发的 CTCL 患者。

3. 抗 CD30 单抗:维布妥昔单抗是靶向 CD30 的抗体偶联药物,由靶向 CD30 蛋白的单克隆抗体和微管破坏剂偶联而成。维布妥昔单抗与 CD30 受体结合后被内化,微管破坏剂随后被释放到细胞质基质中,并在细胞周期的 G2/M 阶段诱导细胞周期停滞^[112]。2020 年 5 月维布妥昔单抗于中国获批上市,用于治疗成人 CD30 阳性的复发或难治性系统性间变性大细胞淋巴瘤和复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤。

4. 抗 CD52 单克隆抗体:阿仑单抗是一种人源化 IgG1 单克隆抗体,靶向 CD52。CD52 是一种存在于正常淋巴细胞以及大多数 B 细胞和 T 细胞恶性肿瘤上的表面抗原,阿仑单抗通过补体依赖性细胞溶解、抗体依赖性细胞介导的细胞毒性和细胞凋亡导致细胞死亡,是第一个用于治疗 T 细胞淋巴瘤的单克隆抗体^[113]。阿仑单抗未被 FDA 批准用于治疗 CTCL,但仍然是难治性 CTCL 患者的可行替代方案。阿仑单抗仅适用于治疗伴或不伴血液系统受累的红皮病型 MF(Ⅲ期和ⅣA 期)患者^[114]。

5. C-C 趋化因子受体(C-C motif chemokine receptor 4, CCR4)拮抗剂:莫加穆利珠单抗是一种去糖化人源化抗体,可选择性结合 CCR4 的 N 末端,通过与效应细胞上 Fcγ 受体结合介导杀伤肿瘤细胞,同时通过消耗 Treg 细胞提高抗肿瘤免疫力^[115]。一项 I/Ⅱ 期临床研究纳入 41 例既往系统治疗过的 CTCL 患者,流式细胞术检测显示,在 19 例血液系统受累患者中,18 例循环恶性细胞显著减少;38 例可评估疗效的 CTCL 患者的完全缓解率为 36.8%,部分缓解率 28.9%,疾病进展 13.2%,疾病稳定

50%^[116]。2018 年 FDA 批准莫加穆利珠单抗可用于既往经至少 1 种系统治疗后复发或难治的 MF 或 SS 成年患者。

原发性皮肤淋巴瘤不同靶向药物适应证、推荐剂量和缓解率见表 5。

(三)皮肤鳞状细胞癌(cutaneous squamous cell carcinoma, cSCC)

cSCC 是一种较常见的非黑色素瘤性皮肤癌,在其中约占 20%^[121]。大多数早期 cSCC 病例在接受手术治疗后预后良好,某些局部治疗方式如冷冻、电干燥刮除术、光动力治疗和放射治疗亦可考虑^[122-124],晚期 cSCC 是导致 cSCC 患者死亡的主要原因,治疗方法有所不同,需要考虑手术、放射治疗和全身治疗等多学科治疗方案^[122,124]。

目前,晚期 cSCC 被 FDA/EMA 批准的系统治疗方法是 PD-1 单抗(如西米普利单抗和帕博利珠单抗)。现已证实 PD-1 单抗具有抗 cSCC 活性,有效率超过 40%,安全性可接受^[125-127]。西米普利单抗(cemiplimab)是一种人源化 IgG4 PD-1 阻断剂,它结合到 PD-1 受体的细胞外区域,限制 PD-1 与其配体(PD-L1 和 PD-L2)的相互作用,从而恢复 T 细胞的活化和抗肿瘤效应^[128]。西米普利单抗于 2018 年获 FDA 批准,并于 2019 年获 EMA 批准,用于治疗不适合手术或放射治疗的转移性或局部晚期的成年 cSCC 患者^[124](推荐等级:B)。西米普利单抗是第一个获批准的 cSCC 系统治疗药物,使用方法为静脉滴注,350 mg/次,每 3 周 1 次,每次滴注时间 30 min 以上。意大利 cSCC 专家小组认为转移性 cSCC 是西米普利单抗的绝对适应证。在局部晚期 cSCC 患者中,绝对适应证包括:深部浸润病灶,无

表 5 原发性皮肤淋巴瘤不同靶向药物适应证、推荐剂量和缓解率

药物	适应证	推荐等级	推荐剂量	缓解率
普拉曲沙 ^[117]	难治性 CTCL	B	每周 15 mg/m ² 体表面积,每 4 周中有 3 周给药,并口服叶酸 1 mg/d,且每 2 个月注射 1 次维生素 B12	45% (13/29)
罗米地辛 ^[118]	系统治疗期间或之后仍进展、持续或复发的 CTCL 患者	B	14 mg/m ² 体表面积,静脉输注 4 h,分别在每个周期的第 1、8 和 15 日给药,28 d 为 1 个周期	34% (33/96)
伏立诺他 ^[110-111]	在 2 种系统治疗后病情仍进展、持续或复发的 CTCL	B	400 mg/d,口服	30% (4/13)
维布妥昔单抗 ^[119]	成人 CD30 阳性的复发或难治性系统性间变性大细胞淋巴瘤和复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤	B	1.8 mg/kg,静脉输注 30 min 以上给药,每 3 周 1 次	70% (21/30)
阿仑单抗 ^[120]	伴或不伴血液系统受累的红皮病型 MF(Ⅲ期和ⅣA 期)患者	C	皮下注射 10 ~ 15 mg,每周 3 次,直至 Sézary 细胞计数 < 1 000/μl	55% (6/11)
莫加穆利珠单抗 ^[116]	既往至少 1 种系统治疗后复发或难治的 MF 或 SS 成年患者	B	推荐剂量为 1 mg/kg,静脉输注至少 60 min。在第 1 个 28 d 周期的第 1、8、15 和 22 天给药,然后在每个随后的 28 d 周期的第 1 和 15 天给药	36.8% (14/38)

注:CTCL,皮肤 T 细胞淋巴瘤;MF,蕈样肉芽肿;SS,干燥综合征

法确定边缘的多发/聚集性病灶,不能获得足够切除边缘的病灶,多次复发的病灶^[129](需结合患者的治疗意愿);相对适应证包括:病灶较大,病灶位于关键区域或重要功能区域,手术实施过于复杂的病灶,由于共病或者高龄不适合接受手术治疗的患者^[129]。帕博利珠单抗是一种人源化 IgG4 κ 单克隆抗体,与 PD-1 受体结合,阻断其与 PD-L1 和 PD-L2 的相互作用,并解除 PD-1 通路介导的免疫应答抑制,包括抗肿瘤免疫应答。帕博利珠单抗于 2020 年获得 FDA 批准用于手术或放射治疗无法治愈的复发或转移性 cSCC 患者(推荐等级:B),每 3 周静脉滴注 200 mg 或每 6 周静脉滴注 400 mg,每次滴注时间 30 min 以上。PD-1 抑制剂可能会增加器官移植排斥反应的风险,对于伴晚期 cSCC 的实体器官移植受者,临床医生应在仔细评估患者的治疗利益和排斥反应风险后,谨慎使用 PD-1 抑制剂,并在开始 PD-1 抑制剂治疗之前,使患者充分了解治疗的风险和益处^[130-131]。

目前,除 FDA/EMA 批准的用于晚期 cSCC 患者治疗的 PD-1 单抗外,所有的系统治疗都是超适应证用药。在国际指南中,表皮生长因子(EGFR)抑制剂联合化疗或者放射治疗是二线治疗方法,可用于有 PD-1 单抗治疗禁忌证的晚期 cSCC 患者^[124]。现已证实,晚期 cSCC 患者 EGFR 的表达升高,且其与 cSCC 的转移风险相关^[132]。现有的 EGFR 抑制剂包括抗 EGFR 抗体(西妥昔单抗、帕尼单抗等)和小分子酪氨酸激酶抑制剂(厄洛替尼、吉非替尼和拉帕替尼)等。

(四)皮肤基底细胞癌(basal cell carcinoma, BCC)

BCC 又称基底细胞上皮瘤,起源于表皮或皮肤附属器的多潜能基底样细胞,分化较好,生长缓慢,有局部破坏性。BCC 的传统治疗包括手术切除、Mohs 显微描记手术、电干燥刮除术、外用药物、光动力疗法、冷冻疗法和放疗等。手术治疗联合非手术手段可提高肿瘤组织清除率,降低治疗不良反应以及获得良好的美容效果^[133]。

维莫德吉(vismodegib)和索尼德吉(sonidegib)是经典的刺猬(hedgehog, Hh)信号通路抑制剂,都属于跨膜 G 蛋白偶联受体抑制剂,可防止信号的级联并维持转录因子 Gli 的抑制,对肿瘤细胞具有细胞抑制和细胞毒性作用^[134]。维莫德吉和索尼德吉是 FDA 和 EMA 批准的靶向口服治疗药物。维莫德

吉适用于局部晚期 BCC 和转移性 BCC(推荐等级:B),而索尼德吉仅在局部晚期 BCC 适用^[135-136](推荐等级:B)。使用方法:维莫德吉推荐 150 mg/次,口服,每日 1 次,直到疾病进展或出现不可接受的毒性;索尼德吉推荐 200 mg/次,口服,每日 1 次,饭前不少于 1 h 或饭后不少于 2 h。

此外,西米普利单抗被 FDA 批准用于局部晚期 BCC 患者,在 Hh 信号通路抑制剂治疗后加速转移的 BCC 患者,或不适合用 Hh 信号通路抑制剂的患者(推荐等级:B)。使用方法:每 3 周 1 次,350 mg/次,静脉注射 30 min。

六、皮肤血管炎

(一)白塞综合征(Behçet's syndrome)

白塞综合征是慢性、复发性、炎症性疾病,可累及大中小血管(动/静脉),特征性表现为反复口腔溃疡、生殖器溃疡、眼部炎症及皮肤病变,严重者伴有胃肠道受累、神经系统疾病、血管疾病或关节炎^[137]。白塞综合征传统的治疗药有非甾体类抗炎药、激素、免疫抑制剂等,根据年龄、性别、受累器官、严重程度及患者的意愿个体化治疗^[138]。累及眼、血管、神经和胃肠道的白塞综合征患者可能较仅有皮肤、口腔黏膜和关节累及的患者预后差。

TNF- α 抑制剂和 IL-17/23 抑制剂较早应用于白塞综合征的临床治疗中,而阿普米司特是唯一获得 FDA 和 EMA 批准用于白塞综合征口腔黏膜溃疡的药物,三者于 2018 年欧洲抗风湿联盟(European Alliance of associations for Rheumatology, EULAR)临床推荐等级均为 A^[138],截至 2024 年 8 月,阿普米司特国内尚未获批用于白塞综合征治疗,结合 EULAR 推荐及临床经验,阿普米司特可作为白塞综合征口腔溃疡治疗三线选择(推荐等级:B)。用法用量:阿普米司特,口服,10 mg/d 开始,每日增加 10 mg,逐渐调整至推荐剂量 30 mg 每日 2 次。其他部分药物如依那西普、IFX、ADA、司库奇尤单抗、乌司奴单抗等均有报道治疗白塞综合征口腔黏膜溃疡有效^[139]。

(二)嗜酸性肉芽肿性血管炎(eosinophilic granulomatosis with polyangiitis, EGPA)

EGPA 是一种可累及全身多个系统、少见的自身免疫性疾病,主要表现为外周血及组织中嗜酸性粒细胞增多、浸润及中小血管的坏死性肉芽肿性炎

症^[140]。EGPA 的传统治疗是系统应用激素,当患者存在不良预后因素^[141]时,还应加用免疫抑制剂,如 CTX、AZA、MTX、MMF 等。对有内脏器官并发症的患者,可使用血浆置换、丙种球蛋白等治疗。干扰素也被用于诱导缓解 EGPA 症状^[142]。对于传统治疗反应较差或不能耐受的 EGPA 患者,可用 IL-5R α 抑制剂、抗 CD20 单抗、抗 IgE 单抗治疗,其中 IL-5R α 抑制剂美泊利单抗已在中国获批用于 EGPA 治疗。

1. IL-5R α 抑制剂:美泊利单抗是一种 IgG1- κ 型人源化单克隆抗体,其受体 IL-5R α 在嗜酸性粒细胞上高表达。它可以竞争性识别并结合 IL-5R α , 阻断 IL-5 对嗜酸性粒细胞的作用。IL-5 作为嗜酸性粒细胞成熟和分化的刺激因子参与 EGPA 的发病过程,抗 IL-5 单抗已被应用于 EGPA 治疗。2017 年 12 月美泊利单抗获 FDA 批准治疗成人 EGPA,成为首个治疗 EGPA 的生物制剂。2021 年 11 月 19 日,美泊利单抗在中国获批上市,适用于成人 EGPA 的治疗(推荐等级:B)。使用方法:100 mg/次,皮下注射,每 4 周 1 次。

2. 抗 CD20 单抗:2011 年 RTX 被 FDA 批准用于治疗难治性、复发性肉芽肿性多血管炎(GPA)和显微镜下多发性血管炎(MPA)(推荐等级:B)。RTX 能有效诱导和维持缓解 EGPA 病情,还能减少初诊或复发和难治性 EGPA 患者的激素剂量,并且 RTX 对抗中性粒细胞胞质抗体阳性的 EGPA 患者有更好的疗效^[143]。使用方法:诱导缓解期,每周 375 mg/m² 静脉滴注,连续 4 周,或者 1 000 mg/次静脉滴注,共 2 次,每次间隔 2 周;维持期,每 6 个月 500 mg 静脉滴注,持续 18 个月。

3. 抗 IgE 单抗:OMZ 也被用于治疗哮喘和鼻炎症状控制不佳的 EGPA 患者,可使其哮喘症状及肺功能得到有效改善,嗜酸性粒细胞计数明显下降^[144](推荐等级:B)。使用方法:皮下注射,根据体重和血清 IgE 水平调整剂量(75 ~ 600 mg),每 2 ~ 4 周 1 次,具体参见药物说明书。

(三)巨细胞动脉炎(giant cell arteritis, GCA)

GCA 又称颞动脉炎和颞动脉炎,是一种累及大、中动脉的系统性血管炎,受累血管包括主动脉及其分支血管,尤其是颈外动脉颅外支^[145]。系统应用激素是治疗 GCA 的重要手段,可以显著缓解临床症状,减少相关血管并发症的风险^[145-146]。MTX 联合激素治疗 GCA 具有一定的安全性和有效

性,可减少复发,并降低激素用量、减轻激素不良反应,MTX 推荐使用剂量不低于 15 mg/周^[146]。对于严重椎动脉或颈动脉受累的 GCA 患者,可加用阿司匹林,有助于预防患者血管狭窄导致脑血流量减少而发生缺血性事件^[147]。

IL-6 是一种多功能细胞因子,被认为参与 GCA 免疫发病机制的多个环节,GCA 患者的血清和皮损中均可观察到高水平的 IL-6。FDA 和 EMA 均批准在成人 GCA 患者使用皮下注射 TCZ 治疗(推荐等级:B)。欧洲抗风湿病联盟推荐用法为皮下注射每周 1 次,162 mg/次^[146]。临床研究显示,与每隔 1 周注射方案相比,每周注射方案在预防复发方面更有效^[148]。TCZ 治疗的最佳持续时间尚不清楚,推荐将 TCZ 的治疗延长至 18 ~ 24 个月。如果临床缓解得以维持,激素用量成功减少,则可考虑在完全停药前的 6 ~ 12 个月内减少 TCZ 的剂量(如每隔 1 周皮下注射 1 次)^[149]。

(四)肉芽肿性多血管炎(granulomatosis with polyangiitis, GPA)

GPA 是抗中性粒细胞胞质抗体相关血管炎的一种,是主要累及中小动脉的多系统疾病,几乎可累及任何器官,各脏器表现以及严重程度不一,以上/下呼吸道以及肾脏受累最常见且表现最为严重^[150]。GPA 的治疗分为诱导治疗和维持治疗,两者均需应用免疫抑制剂,传统的治疗包括激素、CTX、AZA、MTX、MMF 等。

RTX 常用于诱导 GPA 临床疾病缓解以及严重 GPA 的维持治疗^[151]。FDA、EMA 均已批准该药联合激素治疗 2 岁及以上严重活动性 GPA 患者(推荐等级:B),国内尚未批准该药治疗 GPA。使用方法:①成人:对于活动性 GPA,与激素联合的诱导剂量为 375 mg/m² 体表面积,每周 1 次静脉输注,持续 4 周,如已诱导治疗达到疾病控制,RTX 后续剂量调整为每周 2 次,每次 500 mg,间隔 2 周给药,后续根据临床情况每间隔 6 个月静脉输注 1 次,每次 500 mg;②儿童:诱导方案是与激素联合应用,剂量为 375 mg/m² 体表面积,每周 1 次静脉输注,持续 4 周,如已诱导治疗达到疾病控制,RTX 后续剂量为每周 2 次,每次 250 mg/m²,间隔 2 周,以后每间隔 6 个月给药 1 次。

FDA 于 2021 年 10 月 13 日批准,avacopan(C5a 受体抑制剂)适用于联合标准治疗的成人严重活动性 GPA^[152](推荐等级:B)。我国及欧洲尚未批准。

用法用量:推荐 30 mg/次,每日 2 次,与食物同服;正在使用强效细胞色素 P450 3A4 酶抑制剂的患者剂量应减至 30 mg/d。

(五)坏疽性脓皮病(pyoderma gangrenosum, PG)

PG 是一种少见的慢性非感染性炎症性皮肤病,以皮肤出现复发性、疼痛性及坏死性溃疡为特征。除皮疹局限浅表者,所有患者均推荐系统治疗。局部处理包括溃疡面清创处理,局部应用抗菌药物、激素、钙调磷酸酶抑制剂等。系统治疗主要包括激素、氨苯砜、沙利度胺以及免疫抑制剂如 CSA、CTX、AZA 等,另外抗菌药物如氯法齐明、柳氮磺吡啶、米诺环素、利福平等亦被认为有效。IVIG 及血浆置换一般用于常规治疗失败的患者。目前传统药物治疗仅对部分患者有效,PG 治疗仍较为困难^[153]。

近年来,针对发病过程中一些重要细胞因子及相关免疫通路的生物制剂及小分子药物逐渐应用于该病的治疗,且取得了一定的疗效。主要包括 TNF- α 抑制剂[IFX^[154]、ADA^[155]、依那西普^[156]、培塞利珠单抗^[157]、戈利木单抗^[158]等]、乌司奴单抗^[159]、古塞奇尤单抗^[160]、利生奇珠单抗^[161]和替瑞奇珠单抗等^[162]、IL-17 抑制剂(司库奇尤单抗^[163]、依奇珠单抗^[164]、布罗利尤单抗^[165]等)、IL-1 抑制剂阿那白滞素^[166]、卡那单抗[(canakinumab)等^[167]]、补体 C5a 抑制剂(韦洛利单抗, vilobelimab^[168])及 JAK 抑制剂(托法替布^[169]、巴瑞替尼^[170]、芦可替尼^[171])等。上述药物中,仅针对 IFX 进行过一项小规模随机、双盲、安慰剂对照试验^[154],对 ADA 进行过一项开放标签单臂 III 期临床研究^[155],其他药物均为个案报道或病例系列分析,证据级别较弱。

上述靶向药物在 PG 中用法用量无统一的标准可循,文献中多数采用了药物说明书中的标准用法,单独使用或与激素、免疫抑制剂等联合应用。

(六)Sweet 综合征(Sweet's syndrome)

Sweet 综合征又称急性发热性嗜中性皮病(acute febrile neutrophilic dermatosis),是相对罕见、进展迅速的炎症性疾病,属于中性粒细胞性皮肤病的一种亚型。目前认为是一种由免疫异常导致的 IL-1 β 、IL-17、TNF- α 、干扰素 β 等细胞因子参与的炎症反应。

目前尚无 Sweet 综合征治疗指南,一般而言,系统使用激素是一线用药的基础,辅以外用激素,可迅速改善系统症状和皮损,4~6 周内逐渐减量停

药。其他一线治疗包括碘化钾、秋水仙碱等。二线用药包括吡罗美辛、氯法齐明、CSA、达普松。其他较少使用的药物包括 CTX、MTX 等免疫抑制剂及 IVIG 等^[172-174]。

近年来,国外先后报道依那西普、IFX 和 ADA 等 TNF- α 抑制剂^[175-180]、阿那白滞素(IL-1 拮抗剂)^[181]和 RTX^[182]对于难治性 Sweet 综合征有较好疗效。

(七)其他血管炎性皮肤病

除了上述血管炎性皮肤病外,还有以下几种可应用靶向药物治疗的血管炎性皮肤病:结节性多动脉炎(polyarteritis nodosa, PAN)、显微镜下多血管炎(microscopic polyangiitis, MPA)、IgA 血管炎、冷球蛋白血症性血管炎(cryoglobulinemia vasculitis, CV)及低补体荨麻疹性血管炎(hypocomplementemic urticarial vasculitis, HUV)。

PAN 是一种以中、小动脉节段性炎症与坏死为特征,不伴肾小球肾炎或小血管(如微动脉、微静脉、毛细血管)炎症,且与抗中性粒细胞胞质抗体无关的非肉芽肿性血管炎^[183]。其传统治疗药物为激素及 CTX。HBV 相关 PAN 建议在一般治疗基础上同时应用抗病毒药物、血浆置换等^[184]。目前应用生物制剂治疗 PAN 已颇有成效。RTX、IFX、ADA 和 TCZ 均可作为难治性 PAN 的替代治疗药物^[185-188]。

MPA 是主要累及小血管、无免疫复合物沉积的坏死性血管炎^[189],是一种严重威胁生命的抗中性粒细胞胞质抗体相关性血管炎。传统治疗包括激素联合免疫抑制剂,伴肺纤维化者可使用吡非尼酮^[190],而对于严重的弥漫性肺泡出血者则应考虑血浆置换^[191]。RTX 可用于治疗免疫抑制剂难以控制的 MPA,减少并发症,且可实现激素减停^[192],显著降低 MPA 复发率及延长缓解期^[193]。法国血管炎研究组(French Vasculitis Study Group, FVSG)和改善全球肾脏病预后组织(Kidney Disease Improving Global Outcomes, KDIGO)指南建议,对于育龄期女性,CTX 治疗效果不佳或无法耐受 CTX 不良反应的 MPA 患者,可使用 RTX 联合激素治疗^[194]。TCZ 单药治疗可能是部分 MPA 患者替代治疗的策略,具体适用于何种患者群体仍需大数据支持^[195]。

过敏性紫癜(Henoch-Schönlein purpura)是一类侵犯小血管的免疫复合物性血管炎,主要发病机制为 IgA 沉积。传统治疗,主要包括消除致病因素(如抗感染),卧床休息,激素和免疫抑制剂等,激素

治疗常用于关节肿痛、腹痛及肾脏受累的过敏性紫癜治疗,对于上述疗效不佳可酌情使用 MTX、CSA 等免疫抑制剂。对于难治性过敏性紫癜或有免疫抑制剂禁忌的患者,RTX 联合激素是一种安全而有效的选择,可有效减少住院率^[196]。单独使用 RTX 或 TCZ 也可使 IgA 血管炎得到有效缓解^[197-198]。

CV 的特征是血清中的冷球蛋白在温度低于 37 °C 时形成冷球蛋白免疫复合物,沉积在毛细血管、小静脉或小动脉的血管壁上,导致小血管炎症。既往主要治疗方案包括 CTX 联合激素和血浆置换,但长期免疫抑制治疗有诱发病毒复制、增加感染等风险^[199]。RTX 对大多数复发的 CV 有效,且可避免使用免疫抑制剂和激素^[200]。2018 年 KDIGO 指南指出:对于肾功能稳定和/或非肾病范围蛋白尿的丙型肝炎病毒相关肾小球疾病患者,建议使用直接抗病毒药物(direct-acting antiviral agents)初始治疗,抗病毒治疗无应答的活动性丙型肝炎病毒相关肾小球疾病患者建议行免疫抑制治疗,特别是冷球蛋白血症肾损害患者,推荐 RTX 作为一线免疫抑制药。

HUV 是与荨麻疹和低补体血症相关的血管炎,主要累及小血管,是一种罕见的自身免疫性疾病。激素联合其他免疫抑制剂如 CTX、MMF、CSA、AZA 和 MTX 等,是 HUV 的主要治疗方法^[201],可以抑制免疫复合物形成。氨苯砜可作为治疗 HUV 皮肤病变的首选药物^[202],且可与激素和免疫抑制剂联合应用治疗病情严重者。血浆置换可清除循环免疫复合物,但是作用较为短暂。对于 HUV,在常规激素或免疫抑制剂治疗效果不佳时,可加用 RTX 治疗^[203]。

七、其他皮肤病

(一) 白癜风(vitiligo)

白癜风属于自身免疫性常见皮肤病,以局限性脱色斑为特征。现有的白癜风治疗方法较多,一般根据疾病不同分期进行治疗,在活动期局部或系统应用激素和低剂量光疗等,抑制疾病进展;稳定期则主要采用光疗、外科移植等促进白斑复色^[204-205]。近年来,JAK 抑制剂、PDE-4 抑制剂等多种小分子靶向药物在白癜风治疗上展现良好前景,主要包括以下药物。

1. JAK 抑制剂:通过阻断 JAK-STAT 信号通路抑制白癜风患者循环中 C-X-C 基序趋化因子配体

10(C-X-C motif chemokine ligand 10, CXCL10)的水平,减少 CD8⁺ T 细胞在白斑周围聚集,抑制 T 细胞免疫反应,从而有助于白癜风的治疗。芦可替尼是一种选择性 JAK1、JAK2 抑制剂,其外用乳膏制剂是目前唯一被 FDA 批准用于白癜风治疗的 JAK 抑制剂,国内目前正在开展真实世界研究,适用于治疗 12 岁以上非节段型白癜风患者面部皮损(推荐等级:B)。多中心 II 期和 III 期临床试验均证实其可显著促进面部白斑复色,具体使用方法:1.5% 芦可替尼乳膏,每天 2 次外用^[206-207]。

其他 JAK 抑制剂,主要是托法替布的外用和口服制剂,在小样本临床研究中陆续被证实有益于白癜风治疗,需要更多临床数据支持其应用(推荐等级:C)。系统使用方法:5 mg/次,每日 2 次口服,同时可联合窄谱中波紫外线(NB-UVB)光疗^[208];局部使用方法:2% 托法替布乳膏,每天 2 次外用^[209]。

2. PDE-4 抑制剂:PDE-4 抑制剂可通过激活 cAMP 信号途径,发挥抗炎、抑制 CXCL9 和 CXCL10 产生,调节固有免疫,以及促进黑素生成的作用,因而适用于白癜风治疗(推荐等级:C)。阿普米司特在 IV 至 VI 型(Fitzpatrick 皮肤分型)皮肤患者可以显著增强光疗疗效,具体用法:30 mg/次,口服,每日 2 次。2% 克立硼罗软膏是 PDE-4 抑制剂的外用制剂,具体用法为每日 2 次外用。

3. α 促黑素细胞激素(α -melanocyte-stimulating-hormone, α -MSH): α -MSH 是皮肤黑素皮质系统的重要组成部分,在刺激黑素生成和黑素细胞增殖中发挥关键作用。阿法诺肽是一种人工合成的 α -MSH 类似物。小样本临床对照研究证实阿法诺肽联合 NB-UVB 光疗可有效提高白癜风患者白斑复色的速度和效率,其使用需要更多临床数据支持(推荐等级:C)。具体用法:阿法诺肽植入物(16 mg),皮下植入,每月 1 次,连续 4 ~ 6 个月,与 NB-UVB 联合使用^[210-211]。

(二) 斑秃(alopecia areata)

斑秃是一种精神因素主导、自身免疫相关的非瘢痕性毛发脱失性疾病,可发生于身体任何部位。外用激素是轻中度斑秃的主要治疗药物,面积较大的重度斑秃患者可使用强效激素乳膏封包治疗;外用米诺地尔适用于稳定期及脱发面积较小的斑秃患者,常需与其他治疗联合应用;对于急性进展期和脱发面积较大的中重度斑秃患者,可酌情系统使用激素或免疫抑制剂如 CSA。

JAK 抑制剂可下调 JAK-STAT 通路,预防和治

疗与炎症、免疫以及癌症等相关疾病^[212],应用于斑秃治疗的首个证据是在托法替布治疗银屑病的临床试验中偶然发现(同患的普秃在治疗 8 个月时头发再生)^[213]。巴瑞替尼为 JAK1/2 抑制剂,于 2022 年首先被 FDA 批准用于成人重度斑秃治疗,2023 年 3 月 NMPA 批准用于成人重度斑秃患者(推荐等级:A)。用法用量:推荐剂量 2 mg 每日 1 次口服,如治疗应答不足,可增加至 4 mg 每日 1 次。利特昔替尼是一种靶向非受体型酪氨酸激酶 JAK3 和 TEC 的小分子化合物,2023 年 FDA、NMPA 先后批准利特昔替尼用于治疗 12 岁及以上青少年和成人重度斑秃(推荐等级:A)。用法用量:50 mg,每日 1 次,口服。此外,尚有系列临床报道度普利尤单抗对于斑秃合并 AD 患者,可同时改善脱发,对同时合并 AD、具有个人或家族特应性病史的斑秃患者,度普利尤单抗可作为补充治疗方法(推荐等级:C)。

(三)红细胞生成性原卟啉病(erythropoietic protoporphyria, EPP)

EPP 是一种罕见的完全不外显的常染色体显性遗传性血红素生物合成疾病,少数为常染色体隐性遗传,超过 90% 的 EPP 患者是由于铁螯合酶基因突变导致铁螯合酶活性降低,原卟啉 IX 沉积在皮肤、红细胞和皮肤血管中。约 10% 的患者可出现 PPIX 在肝脏中沉积而导致肝损伤^[214]。EPP 的传统治疗包括通过衣物和物理性遮光剂来避免阳光照射,口服 β 胡萝卜素提高患者的日晒耐受性,窄谱 UVB 治疗可以通过诱导 EPP 患者的皮肤色素沉着来提高光耐受性^[215-216]。

阿法诺肽可与黑素皮质素受体 1(melanocortin 1 receptor)结合,通过增加细胞内 cAMP 含量和酪氨酸酶活性,激活黑素生成,但不受紫外线刺激的影响。目前,阿法诺肽已在欧洲、美国 and 澳大利亚等国家或地区被批准作为成人 EPP 患者的一种对症治疗药物,可以为 EPP 患者提供系统性光保护作用以预防光毒性(推荐等级:B),国内尚未获批。建议患者在使用本品治疗期间继续防晒和采取避光措施,以防止与 EPP 相关的光毒性反应^[217]。使用方法:每 2 个月 1 次皮下植入可生物降解的植入剂(16 mg/个)。植入后最快可在 2 d 内观察到皮肤色素沉着,药效长达 2 个月。

(四)1 型神经纤维瘤病(neurofibromatosis type 1, NF1)

NF1 是一种由 NF1 基因突变引起的神经系统常染色体显性遗传疾病。NF1 可分为 2 种类型:多

发性皮肤型神经纤维瘤(cutaneous neurofibroma, cNF)和丛状型神经纤维瘤(plexiform neurofibromas, pNF)。据报道,有 8% ~ 13%^[218] 的 pNF 患者可能转变为恶性外周神经鞘瘤(malignant peripheral nerve sheath tumors, MPNST), MPNST 的预后较差,5 年总生存率为 35% ~ 50%,这是导致 NF1 患者死亡的主要原因^[219-220]。目前尚缺乏一种普遍可接受的治疗方法。对于 pNF 患者,完全手术切除在技术上极具挑战性,往往不可行,并易导致复发。

司美替尼(selumetinib)是一种口服、高效、选择性 MEK1/2、非 ATP 竞争性抑制剂,可通过选择性抑制 Ras-Raf-MEK-ERK 信号通路中的 MEK 酶,发挥抑制肿瘤生长的作用。鉴于在 I 期^[221] 和 II 期^[222] 临床试验中观察到的良好疗效, FDA 于 2020 年 4 月批准该药用于 2 岁及以上儿童 NF1 患者,这是第一种获批用于治疗 NF1 的药物。2023 年 5 月 NMPA 正式批准,适用于治疗 3 岁及以上伴有症状、无法手术的丛状神经纤维瘤儿童患者(推荐等级:A)。用法用量:司美替尼 25 mg/m²,每天口服 2 次(间隔 12 h)。

(五)遗传性血管性水肿(hereditary angioedema, HAE)

HAE 是一种罕见的常染色体显性遗传病,临床上以反复发作、难以预测的皮肤和黏膜下水肿为特点,水肿可发生在任何部位。最致命的是上呼吸道黏膜水肿,可导致呼吸道阻塞,引发窒息甚至危及生命。目前认为 HAE 的发病机制主要是 C1-INH、FXII、ANGPTI、PLG 基因突变使相应的蛋白表达和/或功能异常,进而引起缓激肽等水平增高,毛细血管扩张,最终引起水肿。根据发病机制不同,目前国际上将 HAE 分为 C1 酯酶抑制剂(C1-INH)缺乏型(HAE-C1-INH)和非 C1-INH 缺乏型(HAE-nC1-INH)^[223]。其中, HAE-C1-INH 型是由于 C1-INH 基因突变导致 C1-INH 水平降低或功能缺陷,临床上分为 I 型和 II 型。I 型患者 C1-INH 浓度及功能均降低,约占 85%; II 型患者 C1-INH 浓度正常或增高,但功能出现异常,约占 15%。HAE 的治疗方法主要包括急性发作治疗和预防治疗,后者分为长期预防和短期预防。传统治疗药物主要包括弱雄激素、抗纤维蛋白溶解剂、新鲜冷冻血浆等。

1. C1-INH: C1-INH 是一种丝氨酸蛋白酶抑制剂,可以调节补体激活和内源性凝血(接触系统)通路,同时也调节纤维蛋白溶解系统。C1-INH 是补

体蛋白酶的主要抑制剂,可直接或间接抑制与 HAE 发作相关的几种蛋白酶^[224]。C1-INH 替代疗法,包括血浆来源 C1-INH(pdC1-INH)和重组人 C1-INH(rhC1-INH),目前是常规预防青少年和成人 HAE 发作的一线治疗(**推荐等级:A**),rhC1-INH 可以作为 pdC1-INH 的替代药物^[225]。建议患者尽早治疗并注意不良反应及注射部位过敏反应。使用方法:静脉滴注 500 U(体重 < 50 kg)或 1 000 U(体重 > 50 kg)pdC1-INH 或缓慢静脉滴注重组 C1-INH 50 U/kg,单次剂量不超过 4 200 U,24 h 内不超过 2 剂。

2. 艾替班特(icatibant):艾替班特是一种强效选择性缓激肽 $\beta 2$ 受体拮抗剂,可通过抑制与 HAE 水肿、炎症、疼痛症状有关的缓激肽治疗急性 HAE,2011 年获 FDA 批准,用于治疗 18 岁及以上成人 HAE 急性发作。基于该药物的有效性和安全性,可以根据患者 HAE 发作部位紧急性及严重程度,在多学科支持基础上,用于 HAE 患者血管性水肿发作的短期预防(**推荐等级:B**)。使用方法:腹部皮下注射(30 mg/次),至少间隔 6 h 可再次注射,24 h 之内注射不超过 3 次。

3. Cinryze: Cinryze 是一种巴氏杀菌、纳米过滤的人血浆衍生的 C1-INH 浓缩物(pdC1-INH)。pdC1-INH 取代了缺失或无功能的 C1-INH,从而增加血浆 C1-INH 的活性水平。因其可以自行给药, Cinryze 是同类药物中第一个被 FDA 批准用于 HAE 患者常规预防的药物。结合国际经验, Cinryze 可用于 HAE 急性发作和预防性治疗(**推荐等级:B**)。存在血栓栓塞事件相关危险因素的患者禁用^[226]。使用方法:每 3 ~ 4 天静脉注射 1 000 IU。对于治疗效果欠佳的患者,可以根据自身反应,考虑每 3 或 4 天使用 2 000 IU(不超过 80 IU/kg)。

4. 艾卡拉肽(ecallantide):艾卡拉肽是一种高度选择性、强效的激肽释放酶抑制剂,可减少缓激肽的产生并减轻急性 HAE 发作时的症状^[227]。艾卡拉肽已被 FDA 批准用于治疗 12 岁及以上全身任何部位 HAE 的急性发作,国内尚未获批,可作为 12 岁及以上患者全身任何部位 HAE 急性发作的三线治疗(**推荐等级:B**)。使用方法:推荐使用剂量为 30 mg(3 ml),分 3 次进行皮下注射,每次 10 mg(1 ml)。如果再次发作,可在 24 h 内皮下注射 30 mg。

5. 拉那利尤单抗(lanadelumab):拉那利尤单抗是一种抗血浆激肽释放酶的全人源 IgG1/ κ 轻链单克隆抗体,可特异性与抗血浆激肽释放酶结合而抑

制其蛋白水解活性,从而控制 HAE 患者的缓激肽过量生成^[228-229]。已在包括美国和欧盟在内的多个国家获得批准,是一种有效、耐受性良好的新型治疗药物。国内尚未获批,可用于 12 岁及以上患者的 I 型或 II 型 HAE 发作的常规预防(**推荐等级:B**)。使用方法:推荐起始剂量为 300 mg/次,每 2 周 1 次,皮下注射给药。当患者病情控制良好或充分控制(即无急性发作)超过 6 个月时,可考虑每间隔 4 周给予 300 mg 的剂量。

(六)化脓性汗腺炎(hidradenitis suppurativa, HS)

HS 是一种好发于腋窝、腹股沟、肛周等顶泌汗腺分布区域的慢性复发性炎症性皮肤病,头皮、耳后也可发生。 γ 分泌酶 3 个亚单位(早老素 1、早老素增强子 2 和 nicastrin 蛋白)基因突变是家族性 HS 患者的遗传学发病因素^[230],炎症、免疫、肥胖、微生物、吸烟等因素也参与致病,出汗、摩擦等因素可加重症状。HS 的治疗需要参考 Hurley 分级标准,同时考虑个体的易感性,传统治疗包括疼痛管理、患者教育、抗生素、维 A 酸类药物以及物理治疗等。

ADA 是目前唯一经 FDA 批准用于 HS 治疗的生物制剂,已被多国指南推荐为中重度 HS 常规治疗失败后的一线生物制剂^[231](**推荐等级:B**)。目前我国尚无经过 NMPA 批准用于治疗 HS 的生物制剂或小分子靶向药物,均为超适应证使用,需遵循知情同意原则,使用期间密切关注相关不良反应。临床试验证明 ADA 40 mg/周治疗,12 周时患者的临床反应、疼痛等评分和症状均可得到显著改善,观察随访中发现疗效可以长期维持^[232]。其他靶向药物如 TNF- α 拮抗剂(依那西普、IFX、培塞利珠单抗等)、IL-17 拮抗剂(司库奇尤单抗等)、IL-1 拮抗剂(阿那白滞素、canakinumab、bermekimab)、IL-12/23 拮抗剂(乌司奴单抗、古塞奇尤单抗)、阿普米司特、补体 C5 α 抑制剂(IFX-1)等已陆续有临床应用,部分尚处于临床试验阶段。

八、结语

大量国内外临床研究、真实世界研究及案例报道显示靶向治疗众多皮肤疾病疗效确切,不良反应相对较小,许多靶向新药获得 NMPA 批准上市后,在国内也初步积累了用药经验。本共识结合了不同皮肤病靶向药物的临床研究数据、上市后临床用

药情况、案例报道、国内外专家学者的实践经验,对于如何合理、安全有效地应用靶向药物提出了建议,供广大皮肤科临床医师作为用药参考。目前皮肤病靶向治疗发展迅猛,新药不断涌现,其用药剂量、用药终点、不良反应等都需要进一步密切观察积累证据经验,以完善用药细节和注意事项,我们将对本共识进行定期更新和补充。

参与本共识制订的专家(按姓名拼音顺序):陈爱军(重庆医科大学附属第一医院)、陈敏(中国医学科学院皮肤病医院)、陈翔(中南大学湘雅医院)、崔勇(中日友好医院)、丁艳(海南省第五人民医院)、范星(安徽医科大学第一附属医院)、高敏(安徽医科大学第一附属医院)、高兴华(中国医科大学附属第一医院)、耿松梅(西安交通大学第二附属医院)、何黎(昆明医科大学第一附属医院)、纪超(福建医科大学附属第一医院)、金哲虎(延边大学附属医院)、康晓静(新疆维吾尔自治区人民医院)、李春英(空军军医大学西京医院)、李明(复旦大学附属儿科医院)、李薇(四川大学华西医院)、李玉叶(昆明医科大学第一附属医院)、梁燕华(南方医科大学深圳医院)、刘全忠(天津医科大学总医院)、刘晓明(华中科技大学协和深圳医院)、鲁严(南京医科大学第一附属医院)、陆前进(中国医学科学院皮肤病医院)、骆肖群(复旦大学附属华山医院)、马琳(首都医科大学附属北京儿童医院)、潘萌(上海交通大学医学院附属瑞金医院)、潘炜华(海军军医大学第二附属医院)、冉玉平(四川大学华西医院)、盛宇俊(中日友好医院)、孙澜(苏州市立医院)、孙青(山东大学齐鲁医院)、陶娟(华中科技大学同济医学院附属协和医院)、王宏林(上海交通大学医学院)、王再兴(安徽医科大学第一附属医院)、谢维(东南大学生命科学与技术学院)、杨斌(南方医科大学皮肤病医院)、杨青(山东第一医科大学附属皮肤病医院)、杨子良(苏州大学附属第一医院)、姚志荣(上海交通大学医学院附属新华医院)、张学军(苏州大学附属第四医院/安徽医科大学第一附属医院)、郑捷(上海交通大学医学院附属瑞金医院)、郑敏(浙江大学医学院附属第二医院)

编写秘书(按姓名拼音顺序):任韵清(浙江大学医学院附属儿童医院)、盛宇俊(中日友好医院)、张博(苏州大学附属第四医院)、朱才红(安徽医科大学第一附属医院)

利益冲突 所有作者均声明无利益冲突。所有专家均声明参与本共识的制订坚持客观的立场,以专业知识研究数据和临床经验为依据,所持观点未受到任何企业的影响。本共识的制订未接受任何企业任何形式的赞助

参 考 文 献

- [1] Lee YT, Tan YJ, Oon CE. Molecular targeted therapy: treating cancer with specificity[J]. Eur J Pharmacol, 2018,834:188-196. doi: 10.1016/j.ejphar.2018.07.034.
- [2] 中华医学会皮肤性病学分会银屑病专业委员会. 中国银屑病诊疗指南(2023 版)[J]. 中华皮肤科杂志, 2023,56(7):573-625. doi: 10.35541/cjd.20220839.
- [3] Nakajima K, Kanda T, Takaishi M, et al. Distinct roles of IL-23 and IL-17 in the development of psoriasis-like lesions in a mouse model[J]. J Immunol, 2011,186(7):4481-4489. doi: 10.4049/jimmunol.1000148.
- [4] Rendon A, Schäkel K. Psoriasis pathogenesis and treatment[J]. Int J Mol Sci, 2019,20(6):1475. doi: 10.3390/ijms20061475.
- [5] Torres T, Filipe P. Small molecules in the treatment of psoriasis[J]. Drug Dev Res, 2015,76(5):215-227. doi: 10.1002/ddr.21263.
- [6] 中华医学会皮肤性病学分会, 中国医师协会皮肤科医师分会, 中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会. 中国银屑病生物制剂及小分子药物治疗指南(2024 版)[J]. 中华皮肤科杂志, 2024,57(11):976-997. doi: 10.35541/cjd.20240294.
- [7] Wang D, Chong VC, Chong WS, et al. A review on pityriasis rubra pilaris[J]. Am J Clin Dermatol, 2018,19(3):377-390. doi: 10.1007/s40257-017-0338-1.
- [8] Naidoo A, Sibbald C, Fleming PJ, et al. Use of biologics in pityriasis rubra pilaris refractory to first-line systemic therapy: a systematic review [Formula: see text][J]. J Cutan Med Surg, 2020,24(1):73-78. doi: 10.1177/1203475419887731.
- [9] Ioannides D, Vakirlis E, Kemeny L, et al. European S1 guidelines on the management of lichen planus: a cooperation of the European Dermatology Forum with the European Academy of Dermatology and Venereology[J]. J Eur Acad Dermatol Venereol, 2020,34(7):1403-1414. doi: 10.1111/jdv.16464.
- [10] Boch K, Langan EA, Zillikens D, et al. Retrospective analysis of the clinical characteristics and patient-reported outcomes in vulval lichen planus: results from a single-center study[J]. J Dermatol, 2021,48(12):1913-1917. doi: 10.1111/1346-8138.16191.
- [11] Solimani F, Hilke FJ, Ghoreschi K. Pharmacology of Janus kinase inhibitors[J]. Hautarzt, 2019,70(12):934-941. doi: 10.1007/s00105-019-04509-x.
- [12] Alves de Medeiros AK, Speeckaert R, Desmet E, et al. JAK3 as an emerging target for topical treatment of inflammatory skin diseases[J]. PLoS One, 2016,11(10):e0164080. doi: 10.1371/journal.pone.0164080.
- [13] Di Lernia V. Targeting the IFN- γ /CXCL10 pathway in lichen planus[J]. Med Hypotheses, 2016,92:60-61. doi: 10.1016/j.mehy.2016.04.042.
- [14] Damsky W, Wang A, Olamiju B, et al. Treatment of severe lichen planus with the JAK inhibitor tofacitinib[J]. J Allergy Clin Immunol, 2020,145(6):1708-1710.e2. doi: 10.1016/j.jaci.2020.01.031.
- [15] Seiringer P, Lauffer F, Pilz AC, et al. Tofacitinib in hypertrophic lichen planus[J]. Acta Derm Venereol, 2020,100(14):adv00220. doi: 10.2340/00015555-3585.
- [16] Iorizzo M, Haneke E. Tofacitinib as treatment for nail lichen planus associated with alopecia universalis[J]. JAMA Dermatol, 2021,157(3):352-353. doi: 10.1001/jamadermatol.2020.4555.
- [17] Yang CC, Khanna T, Sallee B, et al. Tofacitinib for the treatment of lichen planopilaris: a case series[J]. Dermatol Ther, 2018,31(6):e12656. doi: 10.1111/dth.12656.
- [18] Lu R, Zeng X, Han Q, et al. Overexpression and selectively regulatory roles of IL-23/IL-17 axis in the lesions of oral lichen planus[J]. Mediators Inflamm, 2014,2014:701094. doi: 10.1155/2014/701094.
- [19] Gueiros LA, Araújo T, Souza T, et al. IL17A polymorphism and elevated IL17A serum levels are associated with oral lichen planus[J]. Oral Dis, 2018,24(3):377-383. doi: 10.1111/odi.12718.
- [20] Hobo A, Harada K, Maeda T, et al. IL-17-positive mast cell infiltration in the lesional skin of lichen planopilaris: possible role of mast cells in inducing inflammation and dermal fibrosis in cicatricial alopecia[J]. Exp Dermatol, 2020,29(3):273-277.

- doi: 10.1111/exd.13816.
- [21] Piccinni MP, Lombardelli L, Logiodice F, et al. Potential pathogenetic role of Th17, Th0, and Th2 cells in erosive and reticular oral lichen planus [J]. *Oral Dis*, 2014,20(2):212-218. doi: 10.1111/odi.12094.
 - [22] Shaker O, Hassan AS. Possible role of interleukin - 17 in the pathogenesis of lichen planus [J]. *Br J Dermatol*, 2012,166(6): 1367-1368. doi: 10.1111/j.1365-2133.2011.10793.x.
 - [23] Wang H, Han Q, Luo Z, et al. Oral lichen planus may enhance the expression of Th17-associated cytokines in local lesions of chronic periodontitis [J]. *Clin Oral Investig*, 2014,18(6):1647-1654. doi: 10.1007/s00784-013-1131-z.
 - [24] Ismail FF, Sinclair R. Clinical healing of erosive oral lichen planus with tildrakizumab implicates the interleukin - 23/interleukin-17 pathway in the pathogenesis of lichen planus [J]. *Australas J Dermatol*, 2020,61(2): e244 - e245. doi: 10.1111/ajd.13183.
 - [25] Solimani F, Pollmann R, Schmidt T, et al. Therapeutic targeting of Th17/Tc17 cells leads to clinical improvement of lichen planus [J]. *Front Immunol*, 2019, 10: 1808. doi: 10.3389/fimmu.2019.01808.
 - [26] Sil S, Shome S, Saha N, et al. Apremilast in oral lichen planus: report of two cases and review of literature [J]. *Indian J Dermatol*, 2023,68(6):728. doi: 10.4103/ijdm.ijdm_499_23.
 - [27] Goñi Esarte S, Arín Letamendía A, Vila Costas JJ, et al. Rituximab as rescue therapy in refractory esophageal lichen planus [J]. *Gastroenterol Hepatol*, 2013,36(4):264 - 267. doi: 10.1016/j.gastrohep.2012.07.004.
 - [28] Irla N, Schneider T, Haneke E, et al. Nail lichen planus: successful treatment with etanercept [J]. *Case Rep Dermatol*, 2010,2(3):173-176. doi: 10.1159/000321419.
 - [29] 王侠生, 廖康煌. 杨国亮皮肤病学 [M]. 上海: 上海科学技术文献出版社, 2005.
 - [30] 赵辨. 中国临床皮肤病学 [M]. 南京: 江苏科学技术出版社, 2010.
 - [31] Duong TA, Valeyrie - Allanore L, Wolkenstein P, et al. Severe cutaneous adverse reactions to drugs [J]. *Lancet*, 2017, 390(10106):1996-2011. doi: 10.1016/S0140-6736(16)30378-6.
 - [32] 中华医学会皮肤性病学分会药物不良反应研究中心. Stevens-Johnson 综合征/中毒性表皮坏死松解症诊疗专家共识 [J]. *中华皮肤科杂志*, 2021,54(5):376-381. doi: 10.35541/cjd.20201177.
 - [33] 中华医学会皮肤性病学分会, 中国医师协会皮肤科医师分会. 中国中重度特应性皮炎诊疗临床路径专家共识 (2023 版) [J]. *中华皮肤科杂志*, 2023,56(11):1000-1007. doi: 10.35541/cjd.20230247.
 - [34] 中华医学会皮肤性病学分会荨麻疹研究中心. 中国荨麻疹诊疗指南 (2022 版) [J]. *中华皮肤科杂志*, 2022,55(12):1041-1049. doi: 10.35541/cjd.20220609.
 - [35] Zuberbier T, Asero R, Bindslev - Jensen C, et al. EAACI/GA²LEN/EDF/WAO guideline: management of urticaria [J]. *Allergy*, 2009, 64(10): 1427 - 1443. doi: 10.1111/j. 1398 - 9995.2009.02178.x.
 - [36] Bulkhi A, Cooke AJ, Casale TB. Biologics in chronic urticaria [J]. *Immunol Allergy Clin North Am*, 2017,37(1):95-112. doi: 10.1016/j.iac.2016.08.004.
 - [37] Chen YD, Maurer M, Yu M, et al. Addition of omalizumab to antihistamine treatment in chronic urticaria: a real-world study in China [J]. *Ann Allergy Asthma Immunol*, 2020,125(2):217-219. doi: 10.1016/j.anai.2020.04.026.
 - [38] Netchiporouk E, Nguyen CH, Thuraishingham T, et al. Management of pediatric chronic spontaneous and physical urticaria patients with omalizumab: case series [J]. *Pediatr Allergy Immunol*, 2015,26(6):585-588. doi: 10.1111/pai.12407.
 - [39] 中华医学会皮肤性病学分会荨麻疹研究中心. 抗 IgE 疗法——奥马珠单抗治疗慢性荨麻疹专家共识 [J]. *中华皮肤科杂志*, 2021,54(12):1057-1062. doi: 10.35541/cjd.20210568.
 - [40] Pereira MP, Steinke S, Zeidler C, et al. European academy of dermatology and venereology European prurigo project: expert consensus on the definition, classification and terminology of chronic prurigo [J]. *J Eur Acad Dermatol Venereol*, 2018,32(7): 1059-1065. doi: 10.1111/jdv.14570.
 - [41] Zeidler C, Yosipovitch G, Ständer S. Prurigo nodularis and its management [J]. *Dermatol Clin*, 2018,36(3):189-197. doi: 10.1016/j.det.2018.02.003.
 - [42] Leis M, Fleming P, Lynde CW. Prurigo nodularis: review and emerging treatments [J]. *Skin Therapy Lett*, 2021,26(3):5-8.
 - [43] Williams KA, Huang AH, Belzberg M, et al. Prurigo nodularis: pathogenesis and management [J]. *J Am Acad Dermatol*, 2020, 83(6):1567-1575. doi: 10.1016/j.jaad.2020.04.182.
 - [44] Ständer S, Yosipovitch G, Legat FJ, et al. Trial of nemolizumab in moderate-to-severe prurigo nodularis [J]. *N Engl J Med*, 2020, 382(8):706-716. doi: 10.1056/NEJMoa1908316.
 - [45] Chen J, Li H, Zhu H. Successful treatment of chronic actinic dermatitis with dupilumab: a case report and review of the literature [J]. *Clin Cosmet Investig Dermatol*, 2021, 14: 1913 - 1917. doi: 10.2147/CCID.S342401.
 - [46] Ali K, Wu L, Lou H, et al. Clearance of chronic actinic dermatitis with dupilumab therapy in Chinese patients: a case series [J]. *Front Med (Lausanne)*, 2022,9:803692. doi: 10.3389/fmed.2022.803692.
 - [47] Patel N, Konda S, Lim HW. Dupilumab for the treatment of chronic actinic dermatitis [J]. *Photodermatol Photoimmunol Photomed*, 2020,36(5):398-400. doi: 10.1111/phpp.12566.
 - [48] 陈国, 杨宝琦. 利妥昔单抗治疗自身免疫性大疱病的研究进展 [J]. *实用皮肤病学杂志*, 2019,12(2):90-93.
 - [49] Zhao CY, Murrell DF. Outcome measures for autoimmune blistering diseases [J]. *J Dermatol*, 2015,42(1):31-36. doi: 10.1111/1346-8138.12711.
 - [50] 胥璟, 邓丹琪. 生物制剂治疗类天疱疮的研究进展 [J]. *中国麻风皮肤病杂志*, 2021,37(5):328-331. doi: 10.12144/zgmfskin.202105328.
 - [51] Feliciani C, Joly P, Jonkman MF, et al. Management of bullous pemphigoid: the European Dermatology Forum consensus in collaboration with the European Academy of Dermatology and Venereology [J]. *Br J Dermatol*, 2015, 172(4): 867 - 877. doi: 10.1111/bjd.13717.
 - [52] Polansky M, Eisenstadt R, DeGrazia T, et al. Rituximab therapy in patients with bullous pemphigoid: a retrospective study of 20 patients [J]. *J Am Acad Dermatol*, 2019,81(1):179-186. doi: 10.1016/j.jaad.2019.03.049.
 - [53] Tovanabutra N, Payne AS. Clinical outcome and safety of rituximab therapy for pemphigoid diseases [J]. *J Am Acad Dermatol*, 2020,82(5):1237-1239. doi: 10.1016/j.jaad.2019.11.023.
 - [54] Seyed Jafari SM, Feldmeyer L, Bossart S, et al. Case report: combination of omalizumab and dupilumab for recalcitrant bullous pemphigoid [J]. *Front Immunol*, 2020,11:611549. doi: 10.3389/fimmu.2020.611549.
 - [55] Seidman JS, Eichenfield DZ, Orme CM. Dupilumab for bullous pemphigoid with intractable pruritus [J]. *Dermatol Online J*, 2019,25(11):13030/qt25q9w6r9 [pii].
 - [56] Abdat R, Waldman RA, de Bedout V, et al. Dupilumab as a novel therapy for bullous pemphigoid: a multicenter case series [J]. *J Am Acad Dermatol*, 2020,83(1):46-52. doi: 10.1016/j.jaad.2020.01.089.
 - [57] Fairley JA, Baum CL, Brandt DS, et al. Pathogenicity of IgE in autoimmunity: successful treatment of bullous pemphigoid with omalizumab [J]. *J Allergy Clin Immunol*, 2009,123(3):704-705. doi: 10.1016/j.jaci.2008.11.035.

- [58] James T, Salman S, Stevenson B, et al. IgE blockade in autoimmunity: omalizumab induced remission of bullous pemphigoid[J]. Clin Immunol, 2019,198:54-56. doi: 10.1016/j.clim.2018.12.015.
- [59] Yu KK, Crew AB, Messingham KA, et al. Omalizumab therapy for bullous pemphigoid[J]. J Am Acad Dermatol, 2014,71(3):468-474. doi: 10.1016/j.jaad.2014.04.053.
- [60] Kushner CJ, Payne AS. Increasing the complement of therapeutic options in bullous pemphigoid[J]. J Invest Dermatol, 2018,138(2):246-248. doi: 10.1016/j.jid.2017.09.026.
- [61] Iwata H, Vorobyev A, Koga H, et al. Meta-analysis of the clinical and immunopathological characteristics and treatment outcomes in epidermolysis bullosa acquisita patients[J]. Orphanet J Rare Dis, 2018,13(1):153. doi: 10.1186/s13023-018-0896-1.
- [62] Kim JH, Lee SE, Kim SC. Successful treatment of epidermolysis bullosa acquisita with rituximab therapy[J]. J Dermatol, 2012,39(5):477-479. doi: 10.1111/j.1346-8138.2011.01360.x.
- [63] Hertl M, Zillikens D, Borradori L, et al. Recommendations for the use of rituximab (anti-CD20 antibody) in the treatment of autoimmune bullous skin diseases[J]. J Dtsch Dermatol Ges, 2008,6(5):366-373. doi: 10.1111/j.1610-0387.2007.06602.x.
- [64] Wu F, Gao J, Kang J, et al. B cells in rheumatoid arthritis: pathogenic mechanisms and treatment prospects[J]. Front Immunol, 2021,12:750753. doi: 10.3389/fimmu.2021.750753.
- [65] Kasperkiewicz M, Sadik CD, Bieber K, et al. Epidermolysis bullosa acquisita: from pathophysiology to novel therapeutic options[J]. J Invest Dermatol, 2016,136(1):24-33. doi: 10.1038/JID.2015.356.
- [66] Maruta CW, Miyamoto D, Aoki V, et al. Paraneoplastic pemphigus: a clinical, laboratorial, and therapeutic overview[J]. An Bras Dermatol, 2019,94(4):388-398. doi: 10.1590/abd1806-4841.20199165.
- [67] Kwatra SG, Boozalis E, Pasieka H, et al. Decreased recognition of paraneoplastic pemphigus in patients previously treated with anti-CD20 monoclonal antibodies[J]. Br J Dermatol, 2019,180(5):1238-1239. doi: 10.1111/bjd.17577.
- [68] Zhang H, Hu B, Chen H, et al. Therapy of paraneoplastic pemphigus with rituximab: a case report[J]. Dermatol Ther, 2021,34(6):e15144. doi: 10.1111/dth.15144.
- [69] Viswanath V, Tare D, Patil PC. Successful use of intravenous and intralesional rituximab in paraneoplastic pemphigus with Castleman's disease[J]. Int J Dermatol, 2021,60(9):e352-e354. doi: 10.1111/ijd.15528.
- [70] Kuriyama K, Kitamura Y, Tsuji T, et al. Successful treatment of paraneoplastic pemphigus and bronchiolitis obliterans associated with follicular lymphoma with obinutuzumab and bendamustine[J]. Curr Probl Cancer, 2022,46(2):100813. doi: 10.1016/j.crrp.2021.100813.
- [71] 耿研, 武丽君, 谢其冰, 等. 生物制剂在系统性红斑狼疮中应用的中国专家共识(2024 版)[J]. 中华风湿病学杂志, 2024, 28(2):78-92. doi: 10.3760/cma.j.cn141217-20230711-00190-1.
- [72] Fanouriakis A, Kostopoulou M, Alunno A, et al. 2019 update of the EULAR recommendations for the management of systemic lupus erythematosus[J]. Ann Rheum Dis, 2019,78(6):736-745. doi: 10.1136/annrheumdis-2019-215089.
- [73] 中华医学会风湿病学分会, 国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心, 中国系统性红斑狼疮研究协作组. 2020 中国系统性红斑狼疮诊疗指南[J]. 中华内科杂志, 2020,59(3):172-185. doi: 10.3760/cma.j.issn.0578-1426.2020.03.002.
- [74] Seibold JR, Maher TM, Highland KB, et al. Safety and tolerability of nintedanib in patients with systemic sclerosis-associated interstitial lung disease: data from the SENSICIS trial[J]. Ann Rheum Dis, 2020, 79(11):1478-1484. doi: 10.1136/annrheumdis-2020-217331.
- [75] Shima Y, Kuwahara Y, Murota H, et al. The skin of patients with systemic sclerosis softened during the treatment with anti-IL-6 receptor antibody tocilizumab[J]. Rheumatology (Oxford), 2010,49(12):2408-12. doi: 10.1093/rheumatology/keq275.
- [76] Lilleker J, Murphy S, Cooper R. Selected aspects of the current management of myositis[J]. Ther Adv Musculoskelet Dis, 2016,8(4):136-144. doi: 10.1177/1759720X16655126.
- [77] Waldman R, DeWane ME, Lu J. Dermatomyositis: diagnosis and treatment[J]. J Am Acad Dermatol, 2020,82(2):283-296. doi: 10.1016/j.jaad.2019.05.105.
- [78] Selva-O'Callaghan A, Pinal-Fernandez I, Trallero-Aragués E, et al. Classification and management of adult inflammatory myopathies[J]. Lancet Neurol, 2018,17(9):816-828. doi: 10.1016/S1474-4422(18)30254-0.
- [79] Pertovaara M, Korpela M, Uusitalo H, et al. Clinical follow up study of 87 patients with sicca symptoms (dryness of eyes or mouth, or both)[J]. Ann Rheum Dis, 1999,58(7):423-427. doi: 10.1136/ard.58.7.423.
- [80] Carsons SE, Vivino FB, Parke A, et al. Treatment guidelines for rheumatologic manifestations of Sjögren's syndrome: use of biologic agents, management of fatigue, and inflammatory musculoskeletal pain[J]. Arthritis Care Res (Hoboken), 2017, 69(4):517-527. doi: 10.1002/acr.22968.
- [81] 刘佩玲, 赵金霞, 刘湘源. 干燥综合征治疗指南: 生物制剂的使用疲劳及炎性肌肉骨骼疼痛的治疗[J]. 中华风湿病学杂志, 2017,21(1):67-70. doi: 10.3760/cma.j.issn.1007-7480.2017.01.017.
- [82] Kim P, Grossman JM. Treatment of mixed connective tissue disease[J]. Rheum Dis Clin North Am, 2005,31(3):549-565, viii. doi: 10.1016/j.rdc.2005.04.008.
- [83] Saunders P, Tsipouri V, Keir GJ, et al. Rituximab versus cyclophosphamide for the treatment of connective tissue disease-associated interstitial lung disease (RECITAL): study protocol for a randomised controlled trial[J]. Trials, 2017,18(1):275. doi: 10.1186/s13063-017-2016-2.
- [84] Maher TM, Tudor VA, Saunders P, et al. Rituximab versus intravenous cyclophosphamide in patients with connective tissue disease - associated interstitial lung disease in the UK (RECITAL): a double-blind, double-dummy, randomised, controlled, phase 2b trial[J]. Lancet Respir Med, 2023,11(1):45-54. doi: 10.1016/S2213-2600(22)00359-9.
- [85] Jiang B, Li T, Guo L, et al. Efficacy and safety of rituximab in systemic lupus erythematosus and Sjögren syndrome patients with refractory thrombocytopenia: a retrospective study of 21 cases[J]. J Clin Rheumatol, 2015,21(5):244-250. doi: 10.1097/RHU.0000000000000273.
- [86] Wang CY, Guo SH, Wang LP, et al. Clinical efficacy of low-dose rituximab on hematological abnormalities in patients with connective tissue disease[J]. Int J Clin Pharmacol Ther, 2019,57(10):500-505. doi: 10.5414/CP203453.
- [87] Li S, Zheng S, Tang S, et al. Autoinflammatory pathogenesis and targeted therapy for adult-onset Still's disease[J]. Clin Rev Allergy Immunol, 2020,58(1):71-81. doi: 10.1007/s12016-019-08747-8.
- [88] Kedor C, Listing J, Zernicke J, et al. Canakinumab for treatment of adult-onset Still's disease to achieve reduction of arthritic manifestation (CONSIDER): phase II, randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre, investigator-initiated trial[J]. Ann Rheum Dis, 2020,79(8):1090-1097. doi: 10.1136/annrheumdis-2020-217155.
- [89] Feist E, Quartier P, Fautrel B, et al. Efficacy and safety of canakinumab in patients with Still's disease: exposure-response analysis of pooled systemic juvenile idiopathic arthritis data by age groups[J]. Clin Exp Rheumatol, 2018,36(4):668-675.
- [90] Vitale A, Berlingiero V, Sota J, et al. Real-life data on the efficacy of canakinumab in patients with adult-onset Still's

- disease [J]. *Mediators Inflamm*, 2020,2020: 8054961. doi: 10.1155/2020/8054961.
- [91] Ferlay J, Soerjomataram I, Dikshit R, et al. Cancer incidence and mortality worldwide: sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012 [J]. *Int J Cancer*, 2015, 136 (5): E359-E386. doi: 10.1002/ijc.29210.
- [92] Wong SL, Faries MB, Kennedy EB, et al. Sentinel lymph node biopsy and management of regional lymph nodes in melanoma: American Society of Clinical Oncology and Society of Surgical Oncology Clinical Practice Guideline update [J]. *J Clin Oncol*, 2018,36(4):399-413. doi: 10.1200/JCO.2017.75.7724.
- [93] Byrne EH, Fisher DE. Immune and molecular correlates in melanoma treated with immune checkpoint blockade [J]. *Cancer*, 2017,123(S11):2143-2153. doi: 10.1002/cncr.30444.
- [94] Lee N, Zakka LR, Mihm MC Jr, et al. Tumour - infiltrating lymphocytes in melanoma prognosis and cancer immunotherapy [J]. *Pathology*, 2016,48(2):177-187. doi: 10.1016/j.pathol.2015.12.006.
- [95] Lee AY, Brady MS. Neoadjuvant immunotherapy for melanoma [J]. *J Surg Oncol*, 2021, 123 (3): 782 - 788. doi: 10.1002/jso.26229.
- [96] George DD, Armenio VA, Katz SC. Combinatorial immunotherapy for melanoma [J]. *Cancer Gene Ther*, 2017,24(3):141-147. doi: 10.1038/cgt.2016.56.
- [97] Davies H, Bignell GR, Cox C, et al. Mutations of the BRAF gene in human cancer [J]. *Nature*, 2002,417(6892):949-954. doi: 10.1038/nature00766.
- [98] Si L, Kong Y, Xu X, et al. Prevalence of BRAF V600E mutation in Chinese melanoma patients: large scale analysis of BRAF and NRAS mutations in a 432-case cohort [J]. *Eur J Cancer*, 2012,48(1):94-100. doi: 10.1016/j.ejca.2011.06.056.
- [99] Larkin J, Chiarion - Sileni V, Gonzalez R, et al. Five - year survival with combined nivolumab and ipilimumab in advanced melanoma [J]. *N Engl J Med*, 2019,381(16):1535-1546. doi: 10.1056/NEJMoa1910836.
- [100] Carlino MS, Larkin J, Long GV. Immune checkpoint inhibitors in melanoma [J]. *Lancet*, 2021,398(10304):1002-1014. doi: 10.1016/S0140-6736(21)01206-X.
- [101] Pires da Silva I, Lo S, Quek C, et al. Site-specific response patterns, pseudoprogression, and acquired resistance in patients with melanoma treated with ipilimumab combined with anti - PD - 1 therapy [J]. *Cancer*, 2020, 126 (1): 86 - 97. doi: 10.1002/cncr.32522.
- [102] D'Angelo SP, Larkin J, Sosman JA, et al. Efficacy and safety of nivolumab alone or in combination with ipilimumab in patients with mucosal melanoma: a pooled analysis [J]. *J Clin Oncol*, 2017,35(2):226-235. doi: 10.1200/JCO.2016.67.9258.
- [103] Nakamura Y, Namikawa K, Yoshino K, et al. Anti - PD1 checkpoint inhibitor therapy in acral melanoma: a multicenter study of 193 Japanese patients [J]. *Ann Oncol*, 2020,31(9):1198-1206. doi: 10.1016/j.annonc.2020.05.031.
- [104] 国家卫生健康委. 新型抗肿瘤药物临床应用指导原则(2023年版) [EB/OL]. [2024-01-12]. <https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202401/P020240109528721822127.pdf>.
- [105] 中国临床肿瘤学会指南工作委员会. 中国临床肿瘤学会(CSCO)黑色素瘤诊疗指南 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2021.
- [106] Willemze R, Jaffe ES, Burg G, et al. WHO - EORTC classification for cutaneous lymphomas [J]. *Blood*, 2005, 105 (10):3768-3785. doi: 10.1182/blood-2004-09-3502.
- [107] Wood GS, Wu J. Methotrexate and pralatrexate [J]. *Dermatol Clin*, 2015,33(4):747-755. doi: 10.1016/j.det.2015.05.009.
- [108] Zhang C, Richon V, Ni X, et al. Selective induction of apoptosis by histone deacetylase inhibitor SAHA in cutaneous T - cell lymphoma cells: relevance to mechanism of therapeutic action [J]. *J Invest Dermatol*, 2005,125(5):1045-1052. doi: 10.1111/j.0022-202X.2005.23925.x.
- [109] Woo S, Gardner ER, Chen X, et al. Population pharmacokinetics of romidepsin in patients with cutaneous T-cell lymphoma and relapsed peripheral T-cell lymphoma [J]. *Clin Cancer Res*, 2009,15(4):1496-1503. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-08-1215.
- [110] Duvic M, Talpur R, Ni X, et al. Phase 2 trial of oral vorinostat (suberoylanilide hydroxamic acid, SAHA) for refractory cutaneous T-cell lymphoma (CTCL) [J]. *Blood*, 2007,109(1):31-39. doi: 10.1182/blood-2006-06-025999.
- [111] O'Connor OA, Heaney ML, Schwartz L, et al. Clinical experience with intravenous and oral formulations of the novel histone deacetylase inhibitor suberoylanilide hydroxamic acid in patients with advanced hematologic malignancies [J]. *J Clin Oncol*, 2006,24(1):166-173. doi: 10.1200/JCO.2005.01.9679.
- [112] Bradley AM, Devine M, DeRemer D. Brentuximab vedotin: an anti - CD30 antibody - drug conjugate [J]. *Am J Health Syst Pharm*, 2013,70(7):589-597. doi: 10.2146/ajhp110608.
- [113] Kennedy GA, Seymour JF, Wolf M, et al. Treatment of patients with advanced mycosis fungoides and Sézary syndrome with alemtuzumab [J]. *Eur J Haematol*, 2003,71(4):250-256. doi: 10.1034/j.1600-0609.2003.00143.x.
- [114] Jawed SI, Myskowski PL, Horwitz S, et al. Primary cutaneous T-cell lymphoma (mycosis fungoides and Sézary syndrome): part I . Diagnosis: clinical and histopathologic features and new molecular and biologic markers [J]. *J Am Acad Dermatol*, 2014, 70(2):205.e1-e16; quiz 221-222. doi: 10.1016/j.jaad.2013.07.049.
- [115] Watson S, Marx JB. Mogamulizumab-kpkc: a novel therapy for the treatment of cutaneous T-cell lymphoma [J]. *J Adv Pract Oncol*, 2019,10(8):883-888. doi: 10.6004/jadpro.2019.10.8.10.
- [116] Duvic M, Pinter-Brown LC, Foss FM, et al. Phase 1/2 study of mogamulizumab, a defucosylated anti - CCR4 antibody, in previously treated patients with cutaneous T-cell lymphoma [J]. *Blood*, 2015,125(12):1883-1889. doi: 10.1182/blood-2014-09-600924.
- [117] Horwitz SM, Kim YH, Foss F, et al. Identification of an active, well-tolerated dose of pralatrexate in patients with relapsed or refractory cutaneous T-cell lymphoma [J]. *Blood*, 2012, 119 (18):4115-4122. doi: 10.1182/blood-2011-11-390211.
- [118] Whittaker SJ, Demierre MF, Kim EJ, et al. Final results from a multicenter, international, pivotal study of romidepsin in refractory cutaneous T-cell lymphoma [J]. *J Clin Oncol*, 2010, 28(29):4485-4491. doi: 10.1200/JCO.2010.28.9066.
- [119] Kim YH, Tavallaei M, Sundram U, et al. Phase II investigator-initiated study of brentuximab vedotin in mycosis fungoides and Sézary syndrome with variable CD30 expression level: a multi-institution collaborative project [J]. *J Clin Oncol*, 2015,33(32):3750-3758. doi: 10.1200/JCO.2014.60.3969.
- [120] Lundin J, Hagberg H, Repp R, et al. Phase 2 study of alemtuzumab (anti - CD52 monoclonal antibody) in patients with advanced mycosis fungoides/Sézary syndrome [J]. *Blood*, 2003,101(11):4267-4272. doi: 10.1182/blood-2002-09-2802.
- [121] Nagarajan P, Asgari MM, Green AC, et al. Keratinocyte carcinomas: current concepts and future research priorities [J]. *Clin Cancer Res*, 2019,25(8):2379-2391. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-18-1122.
- [122] 中华医学会皮肤性病学分会皮肤肿瘤研究中心, 中国医师协会皮肤科医师分会皮肤肿瘤学组. 皮肤鳞状细胞癌诊疗专家共识(2021) [J]. *中华皮肤科杂志*, 2021,54(8):653-664. doi: 10.35541/cjd.20201140.
- [123] Aboul-Fettouh N, Morse D, Patel J, et al. Immunotherapy and systemic treatment of cutaneous squamous cell carcinoma [J]. *Dermatol Pract Concept*, 2021, 11 (Suppl 2): e2021169S. doi:

- 10.5826/dpc.11S2a169S.
- [124] Stratigos AJ, Garbe C, Dessinioti C, et al. European interdisciplinary guideline on invasive squamous cell carcinoma of the skin: part 2. Treatment [J]. *Eur J Cancer*, 2020,128:83-102. doi: 10.1016/j.ejca.2020.01.008.
- [125] Grob JJ, Gonzalez R, Basset-Seguín N, et al. Pembrolizumab monotherapy for recurrent or metastatic cutaneous squamous cell carcinoma: a single-arm phase II trial (KEYNOTE-629) [J]. *J Clin Oncol*, 2020,38(25):2916-2925. doi: 10.1200/JCO.19.03054.
- [126] Migden MR, Khushalani NI, Chang A, et al. Cemiplimab in locally advanced cutaneous squamous cell carcinoma: results from an open-label, phase 2, single-arm trial [J]. *Lancet Oncol*, 2020,21(2):294-305. doi: 10.1016/S1470-2045(19)30728-4.
- [127] Maubec E, Boubaya M, Petrow P, et al. Phase II study of pembrolizumab as first-line, single-drug therapy for patients with unresectable cutaneous squamous cell carcinomas [J]. *J Clin Oncol*, 2020,38(26):3051-3061. doi: 10.1200/JCO.19.03357.
- [128] Ogata D, Tsuchida T. Systemic immunotherapy for advanced cutaneous squamous cell carcinoma [J]. *Curr Treat Options Oncol*, 2019,20(4):30. doi: 10.1007/s11864-019-0629-2.
- [129] Argenziano G, Fargnoli MC, Fantini F, et al. Identifying candidates for immunotherapy with cemiplimab to treat advanced cutaneous squamous cell carcinoma: an expert opinion [J]. *Ther Adv Med Oncol*, 2022,14:17588359211066272. doi: 10.1177/17588359211066272.
- [130] Lebas E, Marchal N, Rorive A, et al. Cemiplimab for locally advanced cutaneous squamous cell carcinoma: safety, efficacy, and position in therapy panel [J]. *Expert Rev Anticancer Ther*, 2021,21(4):355-363. doi: 10.1080/14737140.2021.1876567.
- [131] Fisher J, Zeitouni N, Fan W, et al. Immune checkpoint inhibitor therapy in solid organ transplant recipients: a patient-centered systematic review [J]. *J Am Acad Dermatol*, 2020,82(6):1490-1500. doi: 10.1016/j.jaad.2019.07.005.
- [132] Ridd K, Bastian BC. Somatic mutation of epidermal growth factor receptor in a small subset of cutaneous squamous cell carcinoma [J]. *J Invest Dermatol*, 2010,130(3):901-903. doi: 10.1038/jid.2009.312.
- [133] 中华医学会皮肤性病学分会皮肤肿瘤研究中心, 中国医师协会皮肤科医师分会皮肤肿瘤学组. 皮肤基底细胞癌诊疗专家共识(2021) [J]. *中华皮肤科杂志*, 2021,54(9):757-764. doi: 10.35541/cjd.20201139.
- [134] Wahid M, Jawed A, Mandal RK, et al. Vismodegib, itraconazole and sonidegib as hedgehog pathway inhibitors and their relative competencies in the treatment of basal cell carcinomas [J]. *Crit Rev Oncol Hematol*, 2016,98:235-241. doi: 10.1016/j.critrevonc.2015.11.006.
- [135] Casey D, Demko S, Shord S, et al. FDA approval summary: sonidegib for locally advanced basal cell carcinoma [J]. *Clin Cancer Res*, 2017,23(10):2377-2381. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-16-2051.
- [136] Meiss F, Andrlóvá H, Zeiser R. Vismodegib [J]. *Recent Results Cancer Res*, 2018,211:125-139. doi: 10.1007/978-3-319-91442-8_9.
- [137] Fazaa A, Makhlof Y, Ben Massoud F, et al. Behcet disease: epidemiology, classification criteria and treatment modalities [J]. *Expert Rev Clin Immunol*, 2024,20(12):1437-1448. doi: 10.1080/1744666X.2024.2388693.
- [138] Hatemi G, Christensen R, Bang D, et al. 2018 Update of the EULAR recommendations for the management of Behçet's syndrome [J]. *Ann Rheum Dis*, 2018,77(6):808-818. doi: 10.1136/annrheumdis-2018-213225.
- [139] Lin S, Xu Z, Lin Z, et al. Advances in pathogenesis and treatment of ocular involvement in Behçet's disease [J]. *Front Immunol*, 2023,14:1206959. doi: 10.3389/fimmu.2023.1206959.
- [140] 嗜酸性肉芽肿性多血管炎诊治规范多学科专家共识编写组. 嗜酸性肉芽肿性多血管炎诊治规范多学科专家共识 [J]. *中华结核和呼吸杂志*, 2018,41(7):514-521. doi: 10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2018.07.002.
- [141] Pons-Estel GJ, Salerni GE, Serrano RM, et al. Therapeutic plasma exchange for the management of refractory systemic autoimmune diseases: report of 31 cases and review of the literature [J]. *Autoimmun Rev*, 2011,10(11):679-684. doi: 10.1016/j.autrev.2011.04.028.
- [142] Seeliger B, Förster M, Happe J, et al. Interferon- α for induction and maintenance of remission in eosinophilic granulomatosis with polyangiitis: a single-center retrospective observational cohort study [J]. *J Rheumatol*, 2017,44(6):806-814. doi: 10.3899/jrheum.160907.
- [143] Akiyama M, Kaneko Y, Takeuchi T. Rituximab for the treatment of eosinophilic granulomatosis with polyangiitis: a systematic literature review [J]. *Autoimmun Rev*, 2021,20(2):102737. doi: 10.1016/j.autrev.2020.102737.
- [144] Detoraki A, Di Capua L, Varricchi G, et al. Omalizumab in patients with eosinophilic granulomatosis with polyangiitis: a 36-month follow-up study [J]. *J Asthma*, 2016,53(2):201-206. doi: 10.3109/02770903.2015.1081700.
- [145] Lazarewicz K, Watson P. Giant cell arteritis [J]. *BMJ*, 2019,365:11964. doi: 10.1136/bmj.11964.
- [146] Hellmich B, Agueda A, Monti S, et al. 2018 Update of the EULAR recommendations for the management of large vessel vasculitis [J]. *Ann Rheum Dis*, 2020,79(1):19-30. doi: 10.1136/annrheumdis-2019-215672.
- [147] Maz M, Chung SA, Abril A, et al. 2021 American College of Rheumatology/Vasculitis Foundation Guideline for the management of giant cell arteritis and takayasu arteritis [J]. *Arthritis Rheumatol*, 2021,73(8):1349-1365. doi: 10.1002/art.41774.
- [148] Stone JH, Tuckwell K, Dimonaco S, et al. Trial of tocilizumab in giant-cell arteritis [J]. *N Engl J Med*, 2017,377(4):317-328. doi: 10.1056/NEJMoa1613849.
- [149] Cid MC, Ríos-Garcés R, Terrades-García N, et al. Treatment of giant-cell arteritis: from broad spectrum immunosuppressive agents to targeted therapies [J]. *Rheumatology (Oxford)*, 2020,59(Suppl 3):iii17-iii27. doi: 10.1093/rheumatology/kez645.
- [150] Kitching AR, Anders HJ, Basu N, et al. ANCA-associated vasculitis [J]. *Nat Rev Dis Primers*, 2020,6(1):71. doi: 10.1038/s41572-020-0204-y.
- [151] Nozaki Y. New insights into novel therapeutic targets in ANCA-associated vasculitis [J]. *Front Immunol*, 2021,12:631055. doi: 10.3389/fimmu.2021.631055.
- [152] Lee A. Avacopan: first approval [J]. *Drugs*, 2022,82(1):79-85. doi: 10.1007/s40265-021-01643-6.
- [153] Goldust M, Hagstrom EL, Rathod D, et al. Diagnosis and novel clinical treatment strategies for pyoderma gangrenosum [J]. *Expert Rev Clin Pharmacol*, 2020,13(2):157-161. doi: 10.1080/17512433.2020.1709825.
- [154] Brooklyn TN, Dunnill MG, Shetty A, et al. Infliximab for the treatment of pyoderma gangrenosum: a randomised, double blind, placebo controlled trial [J]. *Gut*, 2006,55(4):505-509. doi: 10.1136/gut.2005.074815.
- [155] Yamasaki K, Yamanaka K, Zhao Y, et al. Adalimumab in Japanese patients with active ulcers of pyoderma gangrenosum: twenty-six-week phase 3 open-label study [J]. *J Dermatol*, 2020,47(12):1383-1390. doi: 10.1111/1346-8138.15533.
- [156] Charles CA, Leon A, Banta MR, et al. Etanercept for the treatment of refractory pyoderma gangrenosum: a brief series [J]. *Int J Dermatol*, 2007,46(10):1095-1099. doi: 10.1111/j.1365-4632.2007.03286.x.

- [157] Hurabielle C, Schneider P, Baudry C, et al. Certolizumab pegol - a new therapeutic option for refractory disseminated pyoderma gangrenosum associated with Crohn's disease [J]. *J Dermatolog Treat*, 2016,27(1):67-69. doi: 10.3109/09546634.2015.1034075.
- [158] Diotallevi F, Campanati A, Radi G, et al. Pyoderma gangrenosum successfully treated with golimumab: case report and review of the literature [J]. *Dermatol Ther*, 2019,32(4):e12928. doi: 10.1111/dth.12928.
- [159] Westerdahl JS, Nusbaum KB, Chung CG, et al. Ustekinumab as adjuvant treatment for all pyoderma gangrenosum subtypes [J]. *J Dermatolog Treat*, 2022, 33(4): 2386 - 2390. doi: 10.1080/09546634.2021.1937475.
- [160] Reese AM, Erickson K, Reed KB, et al. Modified dose of guselkumab for treatment of pyoderma gangrenosum [J]. *JAAD Case Rep*, 2022,21:38-42. doi: 10.1016/j.jder.2021.11.030.
- [161] Burgdorf B, Schlott S, Ivanov IH, et al. Successful treatment of a refractory pyoderma gangrenosum with risankizumab [J]. *Int Wound J*, 2020,17(4):1086-1088. doi: 10.1111/iwj.13359.
- [162] Kok Y, Nicolopoulos J, Varigos G, et al. Tildrakizumab in the treatment of PASH syndrome: a potential novel therapeutic target [J]. *Australas J Dermatol*, 2020,61(3):e373-e374. doi: 10.1111/ajd.13285.
- [163] McPhie ML, Kirchhof MG. Pyoderma gangrenosum treated with secukinumab: a case report [J]. *SAGE Open Med Case Rep*, 2020,8:2050313X20940430. doi: 10.1177/2050313X20940430.
- [164] Kao AS, King AD, Daveluy S. Successful treatment of cabozantinib-induced pyoderma gangrenosum with ixekizumab therapy: a case report [J]. *Dermatol Ther*, 2022,35(9):e15716. doi: 10.1111/dth.15716.
- [165] Tee MW, Avarbock AB, Ungar J, et al. Rapid resolution of pyoderma gangrenosum with brodalumab therapy [J]. *JAAD Case Rep*, 2020,6(11):1167-1169. doi: 10.1016/j.jder.2020.08.033.
- [166] Acquitter M, Plantin P, Kupfer I, et al. Anakinra improves pyoderma gangrenosum in psoriatic arthritis: a case report [J]. *Ann Intern Med*, 2015,163(1):70-71. doi: 10.7326/L15-5107.
- [167] Kolios AG, Maul JT, Meier B, et al. Canakinumab in adults with steroid - refractory pyoderma gangrenosum [J]. *Br J Dermatol*, 2015,173(5):1216-1223. doi: 10.1111/bjd.14037.
- [168] Lu JD, Milakovic M, Ortega - Loayza AG, et al. Pyoderma gangrenosum: proposed pathogenesis and current use of biologics with an emphasis on complement C5a inhibitor IFX-1 [J]. *Expert Opin Investig Drugs*, 2020,29(11):1179-1185. doi: 10.1080/13543784.2020.1819981.
- [169] Orfaly VE, Kovalenko I, Tolkachjov SN, et al. Tofacitinib for the treatment of refractory pyoderma gangrenosum [J]. *Clin Exp Dermatol*, 2021,46(6):1082-1085. doi: 10.1111/ced.14683.
- [170] Scheinberg M, Machado LA, M Castro LG, et al. Successful treatment of ulcerated pyoderma gangrenosum with baricitinib, a novel JAK inhibitor [J]. *J Transl Autoimmun*, 2021,4:100099. doi: 10.1016/j.jtauto.2021.100099.
- [171] Nasifoglu S, Heinrich B, Welzel J. Successful therapy for pyoderma gangrenosum with a Janus kinase 2 inhibitor [J]. *Br J Dermatol*, 2018,179(2):504-505. doi: 10.1111/bjd.16468.
- [172] Cohen PR. Sweet's syndrome -- a comprehensive review of an acute febrile neutrophilic dermatosis [J]. *Orphanet J Rare Dis*, 2007,2:34. doi: 10.1186/1750-1172-2-34.
- [173] Mollaeian A, Roudsari H, Talebi E. Sweet's syndrome: a classical presentation of a rare disease [J]. *J Investig Med High Impact Case Rep*, 2019,7: 2324709619895164. doi: 10. 1177/2324709619895164.
- [174] von den Driesch P. Sweet's syndrome (acute febrile neutrophilic dermatosis) [J]. *J Am Acad Dermatol*, 1994,31(4): 535-556; quiz 557-560. doi: 10.1016/s0190-9622(94)70215-2.
- [175] Ambrose NL, Tobin AM, Howard D. Etanercept treatment in Sweet's syndrome with inflammatory arthritis [J]. *J Rheumatol*, 2009,36(6):1348-1349. doi: 10.3899/jrheum.080698.
- [176] Watson IT, Haugh I, Gardner AR, et al. Histiocytoid Sweet syndrome successfully treated with etanercept [J]. *Proc (Bayl Univ Med Cent)*, 2018,31(3):347-349. doi: 10.1080/08998280.2018.1460132.
- [177] Agarwal A, Barrow W, Selim MA, et al. Refractory subcutaneous Sweet syndrome treated with adalimumab [J]. *JAMA Dermatol*, 2016, 152(7): 842 - 844. doi: 10.1001/jamadermatol.2016.0503.
- [178] Calabrese L, Caldarola G, Peris K, et al. Recalcitrant Sweet syndrome successfully treated with adalimumab [J]. *J Dtsch Dermatol Ges*, 2021,19(1):122-124. doi: 10.1111/ddg.14223.
- [179] Foster EN, Nguyen KK, Sheikh RA, et al. Crohn's disease associated with Sweet's syndrome and Sjögren's syndrome treated with infliximab [J]. *Clin Dev Immunol*, 2005,12(2):145-149. doi: 10.1080/17402520500134254.
- [180] Castro-Fernández M, Sánchez-Muñoz D, Ruíz-Granados E, et al. Coexistence of pyoderma gangrenosum and Sweet's syndrome in a patient with ulcerative colitis [J]. *Am J Gastroenterol*, 2007,102(12):2865-2866. doi: 10.1111/j.1572-0241.2007.01528_8.x.
- [181] Kluger N, Gil - Bistes D, Guillot B, et al. Efficacy of anti - interleukin-1 receptor antagonist anakinra (Kineret®) in a case of refractory Sweet's syndrome [J]. *Dermatology*, 2011,222(2): 123-127. doi: 10.1159/000326112.
- [182] Seminario - Vidal L, Guerrero C, Sami N. Refractory Sweet's syndrome successfully treated with rituximab [J]. *JAAD Case Rep*, 2015,1(3):123-125. doi: 10.1016/j.jder.2015.03.002.
- [183] Jennette JC, Falk RJ, Bacon PA, et al. 2012 Revised international Chapel Hill consensus conference nomenclature of vasculitides [J]. *Arthritis Rheum*, 2013, 65(1): 1 - 11. doi: 10.1002/art.37715.
- [184] 王慧杰, 秦蕾, 武森森, 等. 结节性多动脉炎治疗进展 [J]. *世界临床药物*, 2021,42(6):433-437. doi: 10.13683/j.wph.2021.06.002.
- [185] Velasco N, Karki S, Tenreiro OR. Successful treatments of polyarteritis nodosa cerebral vasculitis and recurrent *Elizabethkingia meningoseptica* septicemia in a dialysis patient [J]. *BMJ Case Rep*, 2019,12(11):e231478. doi: 10.1136/bcr-2019-231478.
- [186] Schnappauf O, Zhou Q, Moura NS, et al. Deficiency of adenosine deaminase 2 (DADA2): hidden variants, reduced penetrance, and unusual inheritance [J]. *J Clin Immunol*, 2020, 40(6):917-926. doi: 10.1007/s10875-020-00817-3.
- [187] Ginsberg S, Rosner I, Slobodin G, et al. Infliximab for the treatment of refractory polyarteritis nodosa [J]. *Clin Rheumatol*, 2019,38(10):2825-2833. doi: 10.1007/s10067-019-04474-9.
- [188] Ostrovřnik J, Hočevār A, Lestan B, et al. Long-term follow-up on tocilizumab treatment of AA amyloidosis secondary to polyarteritis nodosa [J]. *Amyloid*, 2016, 23(4): 260 - 261. doi: 10.1080/13506129.2016.1232648.
- [189] Jennette JC, Falk RJ, Andrassy K, et al. Nomenclature of systemic vasculitides. Proposal of an international consensus conference [J]. *Arthritis Rheum*, 1994, 37(2): 187 - 192. doi: 10.1002/art.1780370206.
- [190] Nathan SD, Albera C, Bradford WZ, et al. Effect of pirfenidone on mortality: pooled analyses and meta - analyses of clinical trials in idiopathic pulmonary fibrosis [J]. *Lancet Respir Med*, 2017,5(1):33-41. doi: 10.1016/S2213-2600(16)30326-5.
- [191] Abe Y, Yamaji K, Endo Y, et al. Plasma exchange therapy to reduce mortality in Japanese patients with diffuse alveolar hemorrhage and microscopic polyangiitis [J]. *Ther Apher Dial*, 2020,24(2):208-214. doi: 10.1111/1744-9987.12939.
- [192] Thiel J, Troilo A, Salzer U, et al. Rituximab as induction

- therapy in eosinophilic granulomatosis with polyangiitis refractory to conventional immunosuppressive treatment: a 36-month follow-up analysis [J]. *J Allergy Clin Immunol Pract*, 2017,5(6):1556-1563. doi: 10.1016/j.jaip.2017.07.027.
- [193] Stone JH, Merkel PA, Spiera R, et al. Rituximab versus cyclophosphamide for ANCA-associated vasculitis [J]. *N Engl J Med*, 2010,363(3):221-232. doi: 10.1056/NEJMoa0909905.
- [194] Charles P, Bienvenu B, Bonnotte B, et al. Rituximab: recommendations of the French Vasculitis Study Group (FVSG) for induction and maintenance treatments of adult, antineutrophil cytoplasm antibody - associated necrotizing vasculitides [J]. *Presse Med*, 2013,42(10):1317-1330. doi: 10.1016/j.lpm.2013.08.003.
- [195] Sakai R, Kondo T, Kikuchi J, et al. Corticosteroid-free treatment of tocilizumab monotherapy for microscopic polyangiitis: a single-arm, single-center, clinical trial [J]. *Mod Rheumatol*, 2016,26(6):900-907. doi: 10.3109/14397595.2016.1160968.
- [196] Torosoff M, Breen T, Balulad S, et al. Resolution of sinus bradycardia, high-grade heart block, and left ventricular systolic dysfunction with rituximab therapy in Henoch - Schönlein purpura [J]. *Intern Med J*, 2018,48(7):868-871. doi: 10.1111/imj.13948.
- [197] Pindi Sala T, Michot JM, Snanoudj R, et al. Successful outcome of a corticoid-dependent Henoch - Schönlein purpura adult with rituximab [J]. *Case Rep Med*, 2014,2014:619218. doi: 10.1155/2014/619218.
- [198] Oshima Y, Hoshino J, Suwabe T, et al. Multicentric Castleman's disease associated with IgA vasculitis (Henoch - Schönlein purpura) responding well to tocilizumab: a case report [J]. *Clin Rheumatol*, 2017,36(3):729-733. doi: 10.1007/s10067-017-3568-y.
- [199] Pietrogrande M, De Vita S, Zignego AL, et al. Recommendations for the management of mixed cryoglobulinemia syndrome in hepatitis C virus-infected patients [J]. *Autoimmun Rev*, 2011,10(8):444-454. doi: 10.1016/j.autrev.2011.01.008.
- [200] Quartuccio L, Zuliani F, Corazza L, et al. Retreatment regimen of rituximab monotherapy given at the relapse of severe HCV-related cryoglobulinemic vasculitis: long-term follow up data of a randomized controlled multicentre study [J]. *J Autoimmun*, 2015,63:88-93. doi: 10.1016/j.jaut.2015.07.012.
- [201] Worm M, Sterry W, Kolde G. Mycophenolate mofetil is effective for maintenance therapy of hypocomplementemic urticarial vasculitis [J]. *Br J Dermatol*, 2000,143(6):1324. doi: 10.1046/j.1365-2133.2000.03913.x.
- [202] Eiser AR, Singh P, Shannies HM. Sustained dapsone-induced remission of hypocomplementemic urticarial vasculitis--a case report [J]. *Angiology*, 1997,48(11):1019-1022. doi: 10.1177/000331979704801114.
- [203] Jachiet M, Flageul B, Deroux A, et al. The clinical spectrum and therapeutic management of hypocomplementemic urticarial vasculitis: data from a French nationwide study of fifty-seven patients [J]. *Arthritis Rheumatol*, 2015,67(2):527-534. doi: 10.1002/art.38956.
- [204] 中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会色素病学组, 中华医学会皮肤性病学分会白癜风研究中心, 中国医师协会皮肤科医师分会色素病专委会, 等. 白癜风诊疗共识(2024版) [J]. *中华皮肤科杂志*, 2024,57(12):1065-1070. doi: 10.35541/cjd.20240260.
- [205] Eleftheriadou V, Atkar R, Batchelor J, et al. British Association of Dermatologists guidelines for the management of people with vitiligo 2021 [J]. *Br J Dermatol*, 2022,186(1):18-29. doi: 10.1111/bjd.20596.
- [206] Rosmarin D, Pandya AG, Lebwohl M, et al. Ruxolitinib cream for treatment of vitiligo: a randomised, controlled, phase 2 trial [J]. *Lancet*, 2020,396(10244):110-120. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30609-7.
- [207] Janssen JC, Mulder E, van der Veldt AAM. Two phase 3, randomized, controlled trials of ruxolitinib cream for vitiligo [J]. *N Engl J Med*, 2023,388(3):283. doi: 10.1056/NEJMc2215181.
- [208] Song H, Hu Z, Zhang S, et al. Effectiveness and safety of tofacitinib combined with narrowband ultraviolet B phototherapy for patients with refractory vitiligo in real-world clinical practice [J]. *Dermatol Ther*, 2022,35(11):e15821. doi: 10.1111/dth.15821.
- [209] Mobasher P, Guerra R, Li SJ, et al. Open-label pilot study of tofacitinib 2% for the treatment of refractory vitiligo [J]. *Br J Dermatol*, 2020,182(4):1047-1049. doi: 10.1111/bjd.18606.
- [210] Lim HW, Grimes PE, Agbai O, et al. Afamelanotide and narrowband UV-B phototherapy for the treatment of vitiligo: a randomized multicenter trial [J]. *JAMA Dermatol*, 2015,151(1):42-50. doi: 10.1001/jamadermatol.2014.1875.
- [211] Toh J, Chuah SY, Jhingan A, et al. Afamelanotide implants and narrow-band ultraviolet B phototherapy for the treatment of nonsegmental vitiligo in Asians [J]. *J Am Acad Dermatol*, 2020,82(6):1517-1519. doi: 10.1016/j.jaad.2020.01.035.
- [212] You H, Xu D, Zhao J, et al. JAK inhibitors: prospects in connective tissue diseases [J]. *Clin Rev Allergy Immunol*, 2020,59(3):334-351. doi: 10.1007/s12016-020-08786-6.
- [213] Kobal I, Ramot Y. Janus kinase inhibitors for the treatment of alopecia areata [J]. *Hautarzt*, 2022,73(5):336-343. doi: 10.1007/s00105-022-04982-x.
- [214] Gouya L, Martin-Schmitt C, Robreau AM, et al. Contribution of a common single-nucleotide polymorphism to the genetic predisposition for erythropoietic protoporphyria [J]. *Am J Hum Genet*, 2006,78(1):2-14. doi: 10.1086/498620.
- [215] Collins P, Ferguson J. Narrow-band UVB (TL-01) phototherapy: an effective preventative treatment for the photodermatoses [J]. *Br J Dermatol*, 1995,132(6):956-963. doi: 10.1111/j.1365-2133.1995.tb16955.x.
- [216] Warren LJ, George S. Erythropoietic protoporphyria treated with narrow-band (TL-01) UVB phototherapy [J]. *Australas J Dermatol*, 1998,39(3):179-182. doi: 10.1111/j.1440-0960.1998.tb01278.x.
- [217] Wensink D, Wagenmakers M, Langendonk JG. Afamelanotide for prevention of phototoxicity in erythropoietic protoporphyria [J]. *Expert Rev Clin Pharmacol*, 2021,14(2):151-160. doi: 10.1080/17512433.2021.1879638.
- [218] Evans DG, Baser ME, McGaughan J, et al. Malignant peripheral nerve sheath tumours in neurofibromatosis 1 [J]. *J Med Genet*, 2002,39(5):311-314. doi: 10.1136/jmg.39.5.311.
- [219] Reilly KM, Kim A, Blakely J, et al. Neurofibromatosis type 1-associated MPNST state of the science: outlining a research agenda for the future [J]. *J Natl Cancer Inst*, 2017,109(8):djx124. doi: 10.1093/jnci/djx124.
- [220] Farid M, Demicco EG, Garcia R, et al. Malignant peripheral nerve sheath tumors [J]. *Oncologist*, 2014,19(2):193-201. doi: 10.1634/theoncologist.2013-0328.
- [221] Dombi E, Baldwin A, Marcus LJ, et al. Activity of selumetinib in neurofibromatosis type 1-related plexiform neurofibromas [J]. *N Engl J Med*, 2016,375(26):2550-2560. doi: 10.1056/NEJMoa1605943.
- [222] Gross AM, Wolters PL, Dombi E, et al. Selumetinib in children with inoperable plexiform neurofibromas [J]. *N Engl J Med*, 2020,382(15):1430-1442. doi: 10.1056/NEJMoa1912735.
- [223] Wang Y, Marier JF, Kassir N, et al. Pharmacokinetics, pharmacodynamics, and exposure-response of lanadelumab for hereditary angioedema [J]. *Clin Transl Sci*, 2020,13(6):1208-1216. doi: 10.1111/cts.12806.
- [224] Zuraw BL. Clinical practice. Hereditary angioedema [J]. *N Engl*

- J Med, 2008,359(10):1027-1036. doi: 10.1056/NEJMcp0803977.
- [225] Gupta R, Balduzzi J, Davis - Lorton M. C1 - esterase inhibitor (Cinryze®) use in the treatment of pediatric hereditary angioedema [J]. Immunotherapy, 2018, 10 (8): 635 - 642. doi: 10.2217/imt-2017-0049.
- [226] Gandhi PK, Gentry WM, Bottorff MB. Thrombotic events associated with C1 esterase inhibitor products in patients with hereditary angioedema: investigation from the United States Food and Drug Administration adverse event reporting system database [J]. Pharmacotherapy, 2012, 32 (10): 902 - 909. doi: 10.1002/j.1875-9114.2012.01126.
- [227] Zuraw BL, Christiansen SC. New promise and hope for treating hereditary angioedema[J]. Expert Opin Investig Drugs, 2008,17 (5):697-706. doi: 10.1517/13543784.17.5.697.
- [228] Kenniston JA, Faucette RR, Martik D, et al. Inhibition of plasma kallikrein by a highly specific active site blocking antibody [J]. J Biol Chem, 2014, 289 (34): 23596 - 23608. doi: 10.1074/jbc.M114.569061.
- [229] Zuraw BL, Banerji A, Bernstein JA, et al. US Hereditary Angioedema Association Medical Advisory Board 2013 recommendations for the management of hereditary angioedema due to C1 inhibitor deficiency [J]. J Allergy Clin Immunol Pract, 2013,1(5):458-467. doi: 10.1016/j.jaip.2013.07.002.
- [230] Wang B, Yang W, Wen W, et al. Gamma - secretase gene mutations in familial acne inversa [J]. Science, 2010, 330 (6007):1065. doi: 10.1126/science.1196284.
- [231] Zouboulis CC, Desai N, Emtestam L, et al. European S1 guideline for the treatment of hidradenitis suppurativa/acne inversa [J]. J Eur Acad Dermatol Venereol, 2015, 29 (4): 619 - 644. doi: 10.1111/jdv.12966.
- [232] Kimball AB, Okun MM, Williams DA, et al. Two phase 3 trials of adalimumab for hidradenitis suppurativa [J]. N Engl J Med, 2016,375(5):422-434. doi: 10.1056/NEJMoa1504370.

(收稿日期:2024-01-26)

(本文编辑:尚淑贤)

· 广告目次 ·

璇美 富马酸依美斯汀缓释胶囊	四川德峰药业有限公司	封二
仙琚®丙酸氟替卡松乳膏	浙江仙琚制药股份有限公司	封三
薇姿 德科丝洗发水系列	欧莱雅(中国)有限公司	封四
华邦制药 皮肤科产品集	重庆华邦制药有限公司	对封二
绽妍×安亦佳®重组胎贝粘蛋白水凝胶敷料	湖南科妍创美医疗科技有限公司	对目次1
颜伊施®皮肤屏障修护系列	上海颜伊施生物科技有限公司	目次4a
漾芙甘草特护系列	上海漾芙生物科技有限公司	目次4b
敏白灵 三因紧致焕颜霜/美白淡斑精华液/清透防晒乳	深圳市敏白灵生物科技有限公司	125a
武罗®乳酸依沙吡啶溶液	河北武罗药业有限公司	125b
喜美恩 水杨酸控油去屑洗发水/头皮保湿修护精华露	浙江喜美恩健康管理有限公司	144a
康芙美®舒缓保湿特护乳/甘草精华液	珠海丽阳生物科技有限公司	144b
赛芙维 宝宝屏障舒缓精华乳	金赛药业	160a
欣比克®本维莫德乳膏	广东中昊药业有限公司	160b
安科丽芙®医用修复敷料	西安惠普生物科技有限公司	166a
乾佰纳 疤痕平(儿童专用)	哈尔滨乾佰纳生物药业有限公司	166b
敏菲乐 盐酸非索非那定干混悬剂	济川药业集团有限公司	185a
医美术后护理查询平台	深圳市哈喽云医科技有限公司	185b
育泽头皮护理系列	武汉育泽生物技术有限公司	195a